

Nusring عالي نرسنگ

ليكنه: زاهد محسن + (93)708141784



درمل پيژندنه

فارماکولوژی

فارماکولوژی

عموميات

درمل پيژندنه

عالي نرسنگ

ليكنه او ډيزاين: محمد زاهد "محسن"



Zahid Muhsin



+ (93)708141784



فارمکولوژی Pharmacology

له دوه يوناني کليمو څخه اخستل شوی ده چې Pharmaco په معنا د دوا او Logy په معنا د علم ده.

فارمکولوژی: هغه علم دی چې د درملو د ترکیب، منشاء، تطبیق، جذب، توزیع، میتابولیزم، اطراح، استطباب، مضاد استطباب، جانبي اغیزو او ډوز څخه بحث کوي.

یا فارمکولوژی هغه علم دی کوم چې د دوا او تداوی په اړه معلومات تر مطالعې لاندې نیسي.

د فارمکولوژي ډولونه یا برخې:

1. Pharmaco kinetic
2. Pharmaco dynamic
3. Clinical Pharmacolog
4. Toxicology
5. Pharmacy
6. Pharmaco gnocy
7. Bio dis position
8. Pharmaco economic
9. Pharmaco epidemiology
10. Pharmaco vigilance
11. Chemo therapy



Pharmaco kenetic:

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې دواگانو باندې د عضویت تاثیرات تر مطالعې لاندې نیسي، لکه کله چې دوا وه خوړل شي او عضویت ته داخل شي عضویت کوم عکس العمل ور سره ښیي.

Pharmaco dynamic:

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې په بدن باندې د دوا تاثیرات تر مطالعې لاندې نیسي لکه کله چې دوا وخوړل شي دغه دوا په بدن باندې څه اغیزه لري.

Clinical Pharmacology:

د فارمکولوژی هغه برخه ده چې د ناروغی تشخیص تداوی او وقایه تر مطالعې لاندې نیسي.

Toxicology

فارمکولوژی دا څانګه زهری موادو د ناوړه اغیزو او د هغوی د Antidote څخه بحث کوي. Antidote هغه ماده ده چې د بل درمل د زهری اغیزو مخنیوی کوي.



Nursing عالي نرسنگ

Pharmacy

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې د دوا جوړول او د هغه برابرول تر مطالعې لاندې نیسي.

Pharmacognocy:

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې طبعی درمل تر مطالعې لاندې نیسي، لکه یوناني دواګانې.

Bio disposition:

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې د استعمال شوی دوا میتابولیزم او اطراح تر مطالعې لاندې نیسي.

Pharmacoeconomic:

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې د دوګانو قیمتونه او د هغوی اقتصادي اړخونه تر مطالعې لاندې نیسي.

Pharmacoepidemiology:

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې د ټولنې یو تعداد خلکو باندې د دوا جانبي عوارض تر مطالعې لاندې نیسي.

د فارمکولوژی هغه برخه ده کوم چې په انتاناتو او حیثه ناروغيو کې کیمیاوي مواد تر مطالعې لاندې نیسي.

Chemotherapy:



اساسی درمل (Essential drug)

هغه درملو ته ويل کيږي چې لاندې معيارونه ولري 1. د جامعي صحي نياز مندي رفع کول 2. په مختلفو وختونو کې کافي مقدار 3. مختلف درمليز اشکال 4. مناسب قيمت نوټ: که چېرې دغه پورته معيارونه پوره نکړي اساسی درمل نه دی.

استطابات (Indications)

د يوې خاصې دوا استعمال د يوې خاصې ناروغي لپاره عبارت د استطاب څخه دی يعنې په دې حالت کې دوا استعمالولي شو.

مثال: Omeprazole د معدې السر په ضد استعمالیږي.

او Propranolol د لوړ فشار په ضد استعمالیږي

همدارنگه Insulin د شکر مرض په ضد استعمالیږي.

مضاد استطابات يا Contraindications

هر کله چې يوه دوا په يو حالت يا په يو مرض کې نشو ورکولای دې ته مضاد استطاب وايي يعنې هغه حالت چې درمل نه پکې توصيه کيږي.

مثال: تتراسکلين ماشومانو له نشو ورکولای

لکه Aspirin د معدې مريضانو ته نشو ورکولای

همدارنگه Atorvaslatin مونږ حامله ښځو ته نشو ورکولای.

جانبی عوارض يا Side effects

ناوړه اغيزی يا Adverse effects

نامطلوبه تاثيراتو څخه عبارت دی کوم چې انسان ته نقصان رسوي. مثال: اسپرين د معدې السر پيدا کوي کوم چې د دی دوا ناوړه اغيزه ده

همدارنگه پراستامول ځيکر خرابوي
جينتاميسين د اوریدو صلاحيت کموي

د دوا نامطلوبه تاثيراتو څخه عبارت دی چې مريض ته فائده هم رسوي

مثال: anti histamine د حساسيت په ضد استعمالیږي او ماشومانو ته د خوب راوستلو لپاره ورکول کېږي، نو خوب راوستل (Sedation) د انتی هستامين دوا جانبی عوارض دی کوم چې فائده مند دی.



عالي نرسنگ Nursing

دوز يا Dose

دوز يا Dose: د دوا هغه معين مقدار ته وايي کوم چې د متوقع تاسيرات دوز د ترسره کولو لپاره ور کول کېږي. يا د درملو د هغه مقدار څخه عبارت دی چې د يو ځل لپاره ناروغ ته توصیه کېږي

د دوز واحدات:

Mg

Micro-gram

Mille liter (ml)

International Unite (IU)

بين المللی واحد (IU) دغه واحد د وزن د واحدونو اجزای نه دی بلکې د يو ځانگړي درمل د بيولوژيکي اغيزو معیاري اندازه گيري ده
د IU او د وزن ترمنځ کوم نسبت شتون نلري. هر درمل د IU بيلي اندازه لري
لکه: د Pencillin يو IU مساوی د 0,6micro-gram سره
د Insulin يو IU مساوی د 45,5micro-gram سره

دوزاژ يا Dosage:

په ورځ کې د دوزونو د تعداد او دفعاتو د مقدار د تعین څخه عبارت دی چې ناروغ ته توصیه کېږي.



Dose form

د دوا هغه شکل دی کوم چې د دوا مستخضر مونږ ته را څرگندوی

Toxeetiy

هغه حالت ته وایی چې د دوا د زیات دوز له کبله په ناروغ باندې ناخوښه حالت مینځ ته راځي او د دوا د قطع کیدو څخه وروسته هم اعراض او علایم موجود وي.

Interaction or Senargesm:

دواړه یو معنا لري هغه حالت ته وایی که چیرته یوه دوا د بلې دوا تاثیرات متاثره کړي دغه حالت وایی، بل که چیرته یوه دوا د بلې دوا تاثیرات زیات کړي دیته (سینر جزم) وایی.

Antagonist:

کله چې یو دوا ورکولو او د بلې دوا تاثیرات له مینځه یوسي دیته انتاګونیست وایی.

درمل یا Drugs:

څخه اخستل شوې ده چې د وېشو په معنا ده Drogue کلیمه د فرانسوي کلیمې Drug درمل د کیمیاوي موادو څخه عبارت دی چې د ناروغۍ په تداوي، معالجه، مخنیوي یا تشخیص په منظور استفاده کېږي. یا ډراګ هغه موادو ته ویل کېږي چې د فزیالوژیکو دندو تعدیل او د پتالوژیک حالت د تغیر په خاطر په عضویت کې تطبیق کېږي.



عالي نرسنگ Nursing

دوا يا درمل د WHO له نظره داسې تعريف كيږي:

دوا يا درمل د WHO له نظره داسې تعريف كيږي: دوا هغه خام مواد دي چې چي د بدن فزيالوژيكي دندو تعدل او د پتالوژيكي حالت كې تغيرات، او يا په ژوندي انساجو كې دمايع په موخه تطبيق كيږي او دغه تطبيق د ناروغ لپاره ګټه وړ وي.

د دوا يا درملو اهداف:

1. دوا يا درمل څلور اساسي اهداف لري
1. د ناروغ د Dx يعني تشخيص كولو لپاره
2. د ناروغ د درملنې لپاره استفاده كول
3. د ناروغ د كنټرول لپاره استفاده كول
4. د ناروغ د وقايع لپاره استفاده كول

د درملو يا دوا اساسات:

دوا شپږ اساسات لري

1. تحريكول. لكه په قبضيت كې د كوملو حركت وركوي
2. خپل ټكول او يا وهل. لكه په يو ساحه كې مكروب وهی او له منځه وړي
3. مسموميت منځته راوړي. لكه اسهالات، كانګې ناراحتي
4. مستقيم وژنه. لكه Bi lactum inhibitor دواګانې.

نوټ: Bi lactum inhibitor دواګانې لكه Pencillin او Cephalosporin دي دواړه كورني په ګرام مثبت او ګرام منفي بكترياوو باندې ښه اغيزه كوي او وژني

5. د ودې بطني كول، يا اهسته كول د بكتريا
6. د بدن معافيتي حالت كنټرولول.



درملو نوم ایشودنه (Drug Nomenclature):

درمل په درې ډوله نام گزاری کیری

1. کیمیاوی نوم (Chemical Name)

دا نوم د کیمیاوی جوړښت په اساس ورکول کیری. لکه مثال په توګه، د Aspirin کیمیاوی نوم Acetylsalicylic Acid دی،

نوټ: دغه ډول نوم د ډاکټرانو د علاقې وړ نه دی او په نسخه کې نه لیکل کیری

2. جنریک نوم (Generic Name):

دا نوم د یو کشف کونکي یا ساینس پوه لخوا ورکول شوی وی،

مثال: Paracetamol, Aspirin

نوټ: دغه نوم په نسخه لیکنه کې مناسب دی یعنې په نسخه کې لیکل کیری.

3. تجارتي نوم (Brand Name)

دا نوم د یو کمپنۍ لخوا ورکول شوی وی

لنډ وی، په یادولو یې اسان وی او په نسخه لیکنه کې ترې استفاده کیری.

مثال: د Aspirin تجارتي نوم Dispirin دی.

اوس راځو د دوا په میکانیزم اغیزمن فکتورونو باندې خبرې کوو، چې د دوا په میکانیزم باندې کوم فکتورونه اغیز کوی.



عالي نرسنگک Nursing

هغه فکتورونه کوم چې د دوا په ميکانيزم باندې
تاثيرات راوړي عبارت دي له

1. عمر يا Age

2. د بدن وزن يا Body weight

3. نژاد او ارثيت يا Race and generic

4. جنسيت يا Gender

5. فزيالوژيکي فکتور يا Physiological factor

1. عمر يا Age: عمر هغه فکتور دی کوم چې د دوا په ميکانيزم باندې
تاثيرات راوړي.

بيا عمر څلور نوعی لری:

1. د مور په گېډا کې يو شان تاثیر کوی يعنې فرق لری تاثیر يې

2. نوی زيږيدلي ماشومان په دې بل شان تاثیر لری

3. د 1--2 کلنۍ پوری بل شان تاثیر لری Zah

4. د 12--65 کلنۍ پوری بل ډول تاثیر لری.

نوټ: د 12--65 کلنۍ پوری دغه عمر بيا په دوه ډوله دی چې عبارت
دی له (12--35) په دغه عمر کې چې هر قسم دوا ورکړی حل کولای
شی خو شرط به دا وی چې ناروغ د ځيگر (Liver) او گردی (Kidney)
تکليف ونلری.

او بل د 35--65 کلنۍ په دې عمرونو کې بيا په ځيگر او گرده کې
جمع کيږی حل کولای نشی.



2. د بدن وزن (Body weight): هره دوا د بدن وزن په مطابق ور کولای شو. که یو سړی ډیر چاق اوسی وزن یې 200 کیلو یا 100 کیلو اوسی نو مونږ باید د دوا مقایسه کولو لپاره (وزن) د 50 کیلو نه جیگ وا نخلو د 50 کیلو په مطابق دوا تطبیق کړو.

3. نژاد او ارثیت (Race and generic): دا هم ډیر فکتور لری د دوا په میکانیزم باندې

بعضی دوا په سپین پوست باندې ښه تاثیر کوی

بعضی دوا په غنم رنگ باندې ښه تاثیر کوی

بعضی دوا بیا په تور رنگ باندې ښه تاثیر کوی.

4. جنسیت یا Gender: بعضی دوا په نارینه باندې ښه کار کوی او بعضی په ښځینه باندې

څلور علتونه دی چې په ښځو باندې دوا ښه تاثیر کوی

1. په ښځه کې شحمی انساج ډیر دی

2. په ښځه کې عضلي سیستم یې کم دی

3. په ښځه کې د وینې جریان متغیر دی

4. میاشتنۍ مریضی لری یعنی حیض.

5. فزیالوژیکي فکتور (Physiological factor):

که د فزیالوژیکي حالت څخه ځان یې په پتالوژیکي حالت بدل کړی وی نو داسی ناروغانو ته Historic یا ټک جن ناروغان وای چې دوی ته بیا د پوستکی لاندې Amp Vitamin C یا Amp Water کیږی.



د دوا د تطبيق وخت

د دواگانو د تطبيق وختونه يو له بله فرق لري مثلاً ځينې دواگانې شته چې تر غذا مخکې يا د غذا په منځ کې او يا د غذا څخه وروسته تطبيق کيږي لکه د خوا گرځي ضد دوا د غذا څخه مخکې تطبيق کيږي د اشتها دواگانې د غذا په منځ کې او مخر شي دواگانې تر غذا وروسته تطبيق کيږي.

د دوا د اطراح سرعت: هغه دواگانې چې له عضويت څخه په سرعت سره اطراح کيږي نو د هغوی تاثيرات کم وي او هغه دواگانې چې په ځنډ سره اطراح کيږي تاثير يې اوږد وي.

دوا د اشتراک تاثير: که د ضرورت په وخت کې په يو مريض کې دوه دواگانې په يو ځل تطبيق شي نو يو دوا د بلې دوا تاثير زياتوي او يا يې کموي مثلاً يو مريض ته پراستامول او بروفن يو زای تطبيق کول.

د دوا د جذب سرعت: هر څومره چې يوه دوا ژر جذب شي نو تاثير يې هم ژر شروع کيږي.

د دوا د تجزيې سرعت: هر څومره چې يوه دوا په بدن کې ژر جذب شي نو تاثيرات يې لنډ وي.

د دوا د تطبيق لارې (Rot of administration): يعنې د کومو لارو موږ کولای شو چې ناروغ ته درمل تطبيق کړو

دوا موږ په درې لارو تطبيق کولای شو

1. Internal (مايع له لارې يا کومو له لارې)
2. Parenteral (زرق له لارې)
3. Topical (موضوعی له لارې)



Enteral:

مايع له لاري په دې کې بيا درې برخې شامل دي

1. Oral (خولي له لاري)
2. Sublingual (ژبي لاندې)
3. Rectal (د مقعد له لاري)

Parenteral (زرق له لاري):

هغه زرقی لاري کوم چې د دوا د توصیه لپاره ترې استفاده کېږي

1. Intra venus or intravascular (I-V) د وريد له لاري
2. Intramuscular (I-M) داخل د عضله يا غوښه کې
3. Sub cutaneous (S-C) پوستکي لاندې
4. Intra peritoneal (I-P) داخل د پرتوان
5. Intra articular (I-A) داخل د مفصل
6. Intra the cal (I-T) داخل د نخاع



Topical:

هغه موضوعی لارې چې د دوا د توصیه لپاره ترې استفاده کېږي

1. Intra nasal(I-N) د پوزې په داخل کې
2. Intra Ossess(I-O) هډوکی په داخل کې
3. Intra Ocular Pressure د سترگو په داخل کې د فشار لپاره
4. Intra Ventrical(I-V) داخل د بطين
5. Sub cutaneous (S-C) پوستکي کې
6. Suppiss otery شيف
7. Ear drop سترگو قطره
8. Pomedes/Cream کریم او ملهم

Zahid Oralahsin

د خولي له لارې د دواگانو تطبيق کتي

1. تر ټولو دواگانو مناسبه طريقه
2. مناسب قيمت لري
3. تر ټولو نه خوندي دي يا محفوظ دي
4. تر ټولو نه عام دي
5. تر ټولو نه اقتصادي دي
6. تعقيم ته اړتيا نشته
7. جذب پراخه ساحه لري



خولي له لارې د دواگانو تاوانونه:

1. په اسانۍ سره زر نه جزیبېږي
2. د معدې د تخریش سبب گرځي
3. د معدې د انزایمونو په واسطه کیدای شي چې دغه دوا تخریب شي
4. دغه دواگانې په سریع شکل سره د ناروغ د ناراحتی سبب گرځي
5. دغه دواگانې کوم چې د خولي له لارې توصیه کیږي په خاص دوز او وزن سره ورکړل شي.

د خولي له لارې مضاد استطببات چې دوا نشو ورکولای:

1. غیږې شعوری حالت یعنی بی خوشی حالت
2. هغه کسان چې متکرر ډول استفراقات ولري
3. د شدید انتاناتو اعراض او علایم ولري.

#. Sublingual

د ژبې لاندې د دوا تطبیق:

- هغه دوا چې د ژبې لاندې توصیه کیږي لاندې ګټې لري
1. جذب یې سریع دی د څو ثانیې الیه دقیقې کې جزیبېږي او زر تاثیر کوي
 2. په عاجلو واقعاتو کې استعمالیږي
 3. د وینې دوران ته مستقیماً داخلېږي
 4. په اسانۍ سره تطبیق کیدای شي
 5. د حاضمی انزایمونه د د تخریب څخه ژغورل کیدای شي
 6. معده د تخریب څخه ژغوري.



هغه دواگانې چې د ژبې لاندې توصیه کيږي لاندې تاوانونه لري

1. که چېرته دوا په لوړ دوز سره تطبيق شي د رگونو د غونجيدو سبب گرځي
2. د ژبې لاندې دواگانې په زياته اندازه نشو تطبيق کولی
3. که چېرته د ژبې لاندې دوا په متکرر شکل استفاده شي د ژبې د مخاط تخریب سبب گرځي.

د ټابليتونو خوړل بيا په دوه قسمه دي

1. Swallowing ټيړول
2. مزه يې ټيړول يا چوشيدن (Chewible)

د مقعد له لارې د دواگانو توصیه کول:

ځينې درمل شته چې په رکتوم کې ايسودل کيږي او له دې لارې جذبېږي

مقعد له لارې د دوا توصیه کول په لاندې حالاتو کې استطباب لري

1. هغه ناروغان چې Comatose ولري يعنې شعوري حالت نلري يعنې ټي خوشه وي
2. هغه کسان چې د معدې تخریشي ولري
3. د ضرورت په وخت کې هر څوک دغه عملیه تر سره کولای شي
4. هغه کسان چې متکرر ډول استفراقات ولري
5. هغه کسان چې عمرونه يې زيات وي
6. په عاجلو واقعاتو کې

د مقعد له لارې د دواگانو د تطبيق کتي

1. جذب يې سريع دی
- 2 عمل يې اسان دی
3. په اسانه تطبيق کيدای شي



د مقعد له لارې د دوا د تطبيق تاوانونه:

1. جذب يې غير منظم او ناقص دی
2. د مقعد د مخاط د تخريب سبب گرځي
3. کيدای شي چې د مقعد د التهاب سبب وگرځي يعنې د انتان مداخله
4. ناروغ د شرم احساس کوي

د دوا د تطبيق زريقي لارې Parenteral Rout

د هغې لارې څخه عبارت دی چې دوا پخپله د هضمي سيستم څخه د نورو لارو څخه د وينې دوران ته جذب شي او تاثير وښيي. کومه دوا چې د زريقي له لارې تطبيق کيږي لاندې گټې لري:

1. د دواگانو تاثير يې سريع دی
2. خوا گرځي او اسهالاتو په وخت کې د دې لارې څخه گټه اخستل کيږي
3. په عاجلو واقعاتو کې انتخابي لار ده
4. په متکرر استفراقاتو کې توصيه کيږي يعنې استفراق چې يې زيات وي
5. په کوماتوس Comatose حالت کې توصيه کيږي يعنې بې خوشي حالت کې
6. هغه کسان چې د معدې مشکل ولري.
7. ددې لارې څخه د دوا جذب پوره ده
8. هغه دواگانې چې ډير حجم لري ددې لارې څخه تطبيق کيږي
9. هغه دواگانې چې د نورو لارو نه جذبيږي



زرقي له لارې د دوا تطبيق تاوانونه:

1. زرقي دوا يو غير رجعي او بيرته نه راستنيدونکي دوا ده يعنې بيرت برگشت نلري
2. د درد سبب گرځي
3. د ويرې سبب گرځي
4. انتان ته د داخليدو لپاره زمينه مساعده وي
5. د عصب او رگونو د تخريب خطر موجود دي.

په دې لاره کې لاندې لارې شامل دي

پوست په داخل کې يا Intra Dermal(I-D)
په دې طريقه کې دوا د پوستکي په درم طبقه کې زرقيري ددې
لارې څخه دوا ډير لږ مقدار تطبيق کيږي لکه واکسينونه، د
توبرکلوز تيست او د الرژي تيست

تر پوست لاندې يا Sub Cotaneus(S-C)
په دې طريقه کې دوا د پوست لاندې زرق کيږي لکه انسولين.

په غوښه کې يا Intramuscular (I-M)
په دې طريقه کې دوا په عضله کې زرق کيږي او په دې لاره کې
بايد دوا د 3-4 سي سي څخه اضافه نه وي.



انتي بیوتیکونه Antibiotics

تعریف انتي بیوتیک هغې مادې ته ویل کېږي، چې له یو مایکرو ارګانیزم څخه را منځته یا مشتق شوی او نور مایکرو ارګانیزمونه تخریبوي یا د هغو وده دروی یا یې هم را کموي

پر همدې بنسټ انتي بیوتیکونه پر باکټریا وو باندې د اغېز له پلوه په دوو مهمو

1. بکټریو استاتیک (Bacteriostatic) باکټریا د ودې او نمو دروونکي
2. بکټریسیدل (Bactericidal) د باکټریا وژونکي باندې وېشل کېږي.

د انتي بیوتیکونو د کارولو په اړه

1. انتي بیوتیکونه له باکټریاوي پرازیتي او فنگسي ارګانیزمونو څخه د رامنځته شوو انتاناتو د درملنې لپاره کارول کېږي، چې له هغو سره حساس دی وسیع الساحه انتي بیوتیکونه یا (براد اسپکټرم Broad Spectrum انتي بیوتیک) په بدن کې د بې ضرره ارګانیزمونو د یو یا څو ګروپونو تخریبولو سره شاید د هغو د طبعي میکروبي پوښښ د بدلون سبب شي او له دې مخې شاید په بدن کې له مقاومو ارګانیزمونو څخه د رامنځته شوو انتاناتو شاهد واوسو، همدارنګه شاید د هغو مایکروارګانیزمونو په وړاندې مقاومت ولیدل شي، چې د انتي بیوتیکونو نیمګړی ډوز سره تر درملنې لاندې نیول شوی دی.
2. له انتي بیوتیکونو څخه د کوچنیو او ناچیزو انتاناتو په وړاندې چې د درملو له مرستې پرته له منځه ځي، باید ګټه وانه خیستل شي.



تیر درس ادامه

3. په اوسنی عصر کې په ځانګړي ډول زموږ په هېواد کې، د درملو ډېره کارونه انټي بیوټیکونه جوړوي او انټي بیوټیکونه د ناروغانو د رغېدنې او بهبود په برخه کې ارزښتناک او مهم نقش لوبوي، له بلې خوا انټي بیوټیکونه هغه مهم درمل دي، چې د بېخايه کارونې وړ ګرځي.

4. د انټي بیوټیک د کارونې په وخت کې کوربه عوامل لکه عمر، جنس جنیټیکي اختلالات د (G6PD نشتون) بلاربښت او د ځيګر او پښتورګو فعالیت باید په پام کې نیول شوی وي.

5. په انټي بیوټیکونو سره د درملنې د وخت موده باید په بشپړه کچه په پام کې ونیول شي، پر همدې بنسټ انټي بیوټیکونو سره د درملنې د سریري نښو له منځه تلو وروسته هم باید د لنډې مودې لپاره دوام پیدا کړي، ترڅو د ناروغۍ د راګرځیدو تصور له منځه لاړ شي.

6. د انټي بیوټیکونو د تطبیق لاره باید په کره او سم ډول غوره شي.

7. د دوو یا څو انټي بیوټیکونو هممهاله کارونه یوازې په ځینو ځانګړو حالتونو کې توصیه کېږي، چې د اغېز د میکانیزم، د درملو د تداخل او د متقابلو اغېزو د سمې مطالعې او پوهېدنې اړتیا پېښوي.



تیر درس ادامه

7. د دوو یا څو انتی بیوتیکونو هممهاله کارونه یوازې په ځینو ځانګړو حالتونو کې توصیه کېږي، چې د اغېز د میکانیزم، د درملو د تداخل او د متقابلو اغېزو د سمې مطالعې او پوهېدنې اړتیا پېښوی.

8. انتی بیوتیکونه د باکټریا ضد دی او پر وایرسونو باندې هېڅ اغېز نه لري.

9. د امکان په صورت کې باید، د درملنې لپاره د انتی بیوتیکونو له پیل څخه مخکې د باکټریاوي پتوجن عامل و پېژندل شي او بیا هغه انتی بیوتیک چې ورسره حساس دی، وټاکل شي.

10. له یو ځانګړي پتوجن ارګانیزم څخه د رامنځته شوي حساسیت د درملنې لپاره د څو انتی بیوتیکونو کارول د درملنې معقوله لاره نه ده.

11. د انتی بیوتیکونو د کارولو طریقه او موده د ناروغۍ په ډول او د ناروغ په وضعیت پورې تړاو لري، چې د انتی بیوتیکونو د مقدار ټاکلو، د کارولو د مودې او د کارونې د طریقي په اړه باید په خپل سړي ډول عمل ونه شي.



د انتی بیوٹیکونو د اغیزو له مخې د هغو وېشنه

۱. هغه انتی بیوٹیکونه چې د مثبت گرام د ارگانیزمونو په وړاندې ډېر فعال دی دی.

پین سیلینونه Penicillins

کلیندیمایسین Clindamycin

کلوگزاسیلین، Cloxacillin

اریترومایسین Erythromycin

فلوکزا سیلین، Fluxacillin

ونکومایسین. Vancomycin.



د انتي بیوټیکونو د اغېزو له مخې د هغو وېشنه

2. هغه انتي بیوټیکونه چې د منفی گرام د ارگانیزمونو په وړاندې د بې دیر فعال دی دا دی.

Amikacin امیکاسین،

gentamicin جنتامایسین

kanamycin کینامایسین،

tobramycin توبرامایسین،

ticarcillin ټیکارسیلین



د انټي بيوتيکونو د اغېزو له مخې د هغو وېشنه

3. هغه انټي بيوتيکونه چې د مثبت گرام او منفي گرام د ارگانيزمونو په وړاندې ډېر فعال دي، دا دي

Amoxicillin	اموکسی سيلين،
ampicillin	امپي سيلين،
ampicillin	بکمپي سيلين
carbanicillin	کاربنی سيلين،
Carbocillin	کار فسيلين
cephalosporins,	سيفالوسپورينونه
chloramphenicol	کلورامفينيکول
cyclamen	سيکلاسيلين
imipenem	امپينم،
neomycin	نئومايسين
tetracyclines.	تتراسکليڼونه



د انټي بيوټيکونو د اغېزو له مخې د هغو وېشنه

4. هغه انټي بيوټيکونه چې د
توبرکلوز ناروغۍ په وړاندې کارول
کېږي، دا دي:

کپرومايسين، Cupromycin

سيکلو سيرين cycloserine

ريفامپين، rifampin

اسټرپتومايسين streptomycin

او ځينې نورې نورې and others



Penicillin G potassium

پین سیلین G پوتاشیم، په چټکۍ سره د معدې د اسید په واسطه تجزیه کېږي، له دې مخې د خولې له لارې اغېزناک نه دی او باید د عضلې د زرق له لارې او کله کله د وریدي انفیوژن دننه په ډېر ورو شکل سره تطبیق شي.

درملیز شکل

درملیز شکل د وریدي او عضلې زرقی ویالونو او ۵ میلیونه نړیوال واحد

استطباب:

سینه بغل، پنومونیا، د ستوني انتانات، د وسطی غور التهاب منجیت منگو کو کسی اند کارډیت، عصبي سفلیس، تور ټپ، راگرځېدونکې تبه دماغی آبسه د کانگرین گاز استومايلیت

استطباب مضاد

له پین سیلینونو او سیفالوسپورینونو سره حساسیت

+93708141784

دوز

دوز لویان ۵۰۰۰۰۰ واحد تر ۱ میلیونه واحد د ورځې ۴ ځله، ډېرې ورځې ۱۰ میلیونه ماشومان ۷۱۴۵۰ واحد د بدن فی کیلو ګرام وزن، د ورځې ۴ ځله، یاد معالج ډاکتر د لارښوونې مطابق

جانبی عوارض

جانبی عوارض انا فلکټیک شوک د پوستکي خارش، خطرناکه او زیات حساسیتونه او د مصلونو درد.



Penicillin G sodium

پین سیلین G پوتاشیم، په چټکۍ سره د معدې د اسید په واسطه تجزیه کېږي، له دې مخې د خولې له لارې اغېزناک نه دی او باید د عضلې د زرق له لارې او کله کله د وریدې انفیوژن دننه په ډېر ورو شکل سره تطبیق شي.

درملیز شکل

درملیز شکل زرقی ویالونه 5000000 نړیوال واحد
استطباب:

غابونو په جراحی کې له انډیوکارډیټ څخه وقایه، سینه بغل نومونیا، د ستونی انتانات، د وسطی غوږ التهاب، مننجیټ، عصبی سفلیس تور ټپ، راگرځېدونکې، تبه دماغی، آبه کانگرین گاز استومایلیت

استطباب مضاد

له پین سیلینونو او سیفالوسپورینونو سره حساسیت

+93708141784

دوز

لویان ۲ میلیون واحد، د جراحی له عمل څخه ۳۰ تر ۶۰ دقیقو وړاندې او بیا یو میلیون واحد له جراحی څخه ۶ ساعته وروسته، عضلې یا وریدې ماشومان ۲۵۰۰۰ تر ۳۰۰۰۰۰ واحد د بدن فی کیلو گرام، وزن عضلې یا وریدې زرق، یاد معالج ډاکتر د لارښوونې مطابق.

جانبی عوارض

جانبی عوارض انا فلکټیک شوک د پوستکي خارش، خطرناکه او زیات حساسیتونه او د مفصلونو درد.



Penicillin G Procaine

پروکائین G پین سیلین دغه انټی بیوټیک باکتری سیدیل دی، چې د باکتریا د حجروي محافظتي دېوال سنتیز خنډ گرځي.

درملیز شکل

۴۰۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰۰ ، ۸۰۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰۰۰ او ۸۰۰۰۰۰۰

نړیوال واحد، زرقی ویالونه

استطباب:

متوسط سیستمیک انتانات نه شدید حساس ارگانیزمونه

استطباب مضاد

له پین سیلینونو او سیفالوسپورینونو سره حساسیت جانی عوارض انا فلکتیک، شوک تشنج، د زړه عدم کفایه، نس ناستی کانګې، زړه بدوالی د وینې کمښت لکوپنیا، د پوستکي حساسیتونه

دوز

لویان او د بدن د ۲۵ کیلو گرامه وزن لرونکی کسان ۴۰۰۰۰۰ واحد عضلي زرق له هرو ۱۲ تر ۲۴ ساعتونو وروسته یا د معالج ډاکتر د لارښوونې مطابق.

د درملو متقابلې اغېزې پروبینیسید ، کلورام فینیکول



پینسلین وی Penicillin V

پین سیلین وی د حساسو ارگانیزمونود حجروي دېوال زیاتېدو کې لاسوهنه کوي، چې په پایله کې حجروي دېوال له اسموټیک پلوه شکل بدلوي او د فشار له کبله یې پرسېږي او خپرې کېږي.

درملیز شکل

۲۵۰ او ۵۰۰ ملي گرامه فمی ټابلېټ او یو ۲۵۰ ملي گرامه ټابلېټ په ۵ ملي لیټره فمی سسپنشن کې.

استطباب:

نکروز السټراتیف، له پنومونیایي انتاناتو څخه وقایه، د تنفسی مجرا انتانات، فرنجیت، د وسطی غوږ التهاب، سرخباد، د خولې د جوف انتانات، د روماتیزم د ثانوی تبې وقایه، د مثبت گرام او منفی گرام کوکسی کان.

+93708141784

استطباب مضاد حساسیت او د ځیگر ستونزې

جانبی عوارض د ژبې توروالی، نس ناستی، کانګې، زړه بدوالی، د وینې کمښت، د پوستکي حساسیتونه تشنجی حملې.

دوز د پنومونیایي انتاناتو لپاره لویان ۲۵۰ تر ۵۰۰ ملي گرامه د ورځې ۴ ځله له ۱۲ کلونو څخه کم عمری ماشومان د لویانو نیمایي ډوز یا د معالج ډاکټر د لارښوونې مطابق.