





واکسین او واکسینیشن

واکسین او واکسینیشن

VACCINE & VACCINATION



لیکونکی: - داکتر تاج الدین «ملت مل»

Author: Dr. Tajuddin Milatmal

هیلته ایجوکیشن ریسورس سنتر

و تهیه کوونکی:

د افغانانوله پاره د معی او اجتماعی مرستو ادار

Produced By: Health Education Resource Center.

And

Afghans Health And Social Assistance Organization.

لومړۍ ټوک: ... ۲ کاپي

First Edition: 2000 copies

کال - ۱۹۸۶
Year: 1986

ددی کتاب اصلی هدف د واکسینا تورا نو د پاره دیو عملی مأخذ تهیه کول دی. همدارنگه مونږ خوشبینه یو چه دا کتاب به دیوی قیمتی منبع په توگه د -
ډاکترانو، بنځینه صهی کارکوونکو، اود نورو هغو خلکو د پاره کوم چه
د ناروغیو د مخنیو ډله سره علاقمند دی خپل ارزښت ثابت کړی.

د افغانی مهاجرینو په کیمپونو کښی انتانی امراض ډیر عام دی.
ددی امراضو وقوع د نا کافي غذائی موادو د چاپیریال او شخصي پاکوالی
کمښت سره یوځای یوه داسی «حلقه یا کړی» جوړوی چه د صحت د
دایمی ضعیفوالی په منځ ته راوړلو کښی چټک رول لوبوی.

ددی کړی «حلقه» د ماتیدو ډیره ساده لاره واکسین کول دی
واکسینونه ارزان، د تطبیق طریقہ فی آسانه، او نسبت دی ته چه د عمر د پاره
دیوی ناروغی نه سړی په غذا به یی ډیر لږ تکلیف ده لری.

هیله ده چه ددی کتاب عملی معلومات هغوی ته چه د ناروغیو د غیر ضرور
پېښیدلو نه د مخنیوای چاری سرته رسوی ارزښت مند ثابت شی.

THIS BOOK IS MEANT AS A PRACTICAL MANUAL FOR VACCINATORS HOWEVER, WE ARE OPTIMISTIC THAT IT CAN ALSO PROVE TO BE A VALUABLE RESOURCE FOR PHYSICIANS, LADY HEALTH VISITORS AND ALL OTHERS INTERESTED IN PREVENTION OF ILLNESS.

IN THE AFGHAN REFUGEE VILLAGES, INFECTIOUS DISEASES ARE VERY COMMON. TOGETHER WITH INADEQUATE NUTRITION, POOR, ENVIRONNMENTAL AND PERSONAL HYGIENE, A CYCLE HAS BEEN CREATED THAT CONTINUES TO FOSTER ILL-HEALTH.

ONE OF THE MOST SIMPLE WAYS TO BREAK THIS CYCLE IS BY VACCINATION. VACCINATION IS LESS, COSTLY, EASIER AND LESS TRAUMATIC THAN A LIFETIME OF SUFFERING FROM AN OTHERWISE PREVENTABLE DISEASE.

پښتونستان کتابتون

ټیلیگرام چینل



: اهداء :

دغه اثر د خپل هیواد د هغه ماشومانو
مقدسوار و احوته اهداء کوم چاچه
د صحت تعلیم، تربیی او ژوند کولو،
خوږزی ارزو کانی د خپل هیواد د آزادی
په جنگ کښی خان سرمخا و روته یوری.
او د هیواد د آزادی په لاره کښی د نورو
شهیدانو په خوا کښی د جنگ قربانیان
شول.

فهرست

شماره	عنوان	نخ
۱-	واکسین او واکسنیشن خه شی دی	۱
۲-	د واکسین ارزښت	۲
۳-	معافیت	۴
۴-	د واکسنیشن اهداف	۸
۵-	هغه واکسینونه چه د E.P.I په پروگرام کښی شامل دے	۹
۶-	د واکسنیشن تیم ته لارښوونی	۱۰
۷-	د واکسیناټور مهم وظایف	۱۹
۸-	د واکسینونو ذخیره کول - اخستل، انتقال او سائل په ساکنه (۲۸)	
۹-	د واکسینونو د انتقال د وسایلو په برخه کښی لنډه معلومات (۳۲)	
۱۰-	د کولډ چین د وسایلو د حرارت د معلومولو طریق (۳۷)	
۱۱-	د واکسینونو استعمال په محلی مرکز کښی (۴۳)	
۱۲-	تعقیم کول یا STERILIZATION (۴۴)	
۱۳-	مختلف واکسینونه (۴۷)	
۱۴-	د عمر له مخی د واکسنیشن د تطبیق جدول (۴۸)	
۱۵-	د مختلفو واکسینونو د استعمال په برخه کښی تفصیلات (۵۰)	
۱۶-	د واکسینونو مضاد استطبایات (۵۶)	
۱۷-	د مختلفو واکسینونو جانی عوارض (۵۷)	
۱۸-	هغه خطرات چه ممکن د واکسین کولو څخه پیداشی (۵۸)	
۱۹-	د واکسنیشن ریکارډ - د جستر کول او کارټ وړ کول (۵۹)	
۲۰-	د ورځیني او میاشتني راپورونو تهیه کول (۶۱)	
۲۱-	د کتاب فهمیه د راپورونو نمونی (۶۴ - ۷۷)	

سریزه

ویاړوچه دخپل باشهامت افغانستان اولس او دنوری نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو خلکو ته د دوی د صحت په برخه کې د ناروغی د وقاتی او مخنیوی یو مهمه برخه د (واکسین او واکسینیشن) په نوم لیکو.

د هغه عمومي فرمول بندي په اساس چه د ناروغیو وقایه او مخنیوی د معالجي په نسبت خوځوځله ارزان، آسان، بهتر او قناعت بشونکي وي.

نو واکسینیشن چه د وقایوی طب یوه مهمه او اساسي برخه ده او د یوشمیر خطرناکو ناروغیو څخه مخنیوی کوي هم د زیات ارزښت وړ موضوع ده.

نوځکه مو تصمیم ونيو چه په دې برخه کې د ضرورت وړ معلوماتونه سره راغونډ او دیوی داسې نشري په شکل ئې ترتیب کړو چه حتی دلېر سواد لرونکو خلکو لپاره هم استفادې وړ وي.

په سترگو کور وچه هره ورځ د وروسته پاتې نړۍ د هیوادونو په زرگونو ماشومان د هغه ناروغیو له کبله مري، یا معلول او معذور یزي کوي ناروغی چه د واکسینونو په تطبیق کولو سره په ډیره آسانی د کنترول وړ دي.

د هغې احصائی له مخې چه په ۱۹۸۴ او ۱۹۸۵ کلونو کې په پاکستان کې د میشته افغانی مهاجرو وښو او ماشومانو څخه لاس ته راغی ښکاره چه په ۱۹۸۴ کال کې د ماشومانو د مرگ تناسب په هره ۱۰۰۰ ماشومانو کې ۶۱ تنه یعنی ۶.۱٪ دی چه د دې جملې څخه د ۶.۴٪ واقعاتو سبب د نووزیزیدلو ماشومانو تیتانوس او ۸٪ ئې شری —

وه پداسې حال کې چې د میندو د مرگ تناسب ۱۱.۷۶٪ یعنی ۱۱.۷۶٪ او همداراز د

۱۷۰.۴۰۵ د هغه احصائی له مخې چه په ۱۹۸۳ کال کې تیتانوسه شوی د هر کال په اوږدو کې صرف د هغه ۶ ناروغیو له کبله چه د واکسینیشن پواسطه د هغه مخنیوی کیدای شي

هر کال ۵ میلیونه ماشومان په ټوله نړۍ کې مري او د میلیونه ماشومان معذور یزي یعنی گور، ږوند او د دماغ د نشوونما په تاخراخته کېزي چه په دې توگه په هره دقیقه

کښي دغه ۶ ناروغي ۱۰ کسه وژني او ۱۰ کسه معذور وي .

چه د دغه فيصدي شمير د پراوچت دي چه يو با احساسه شمير دهغي په اوږيدو
سره په لوزان راځي نو د همدې کبله مود واکسينشن په دغه کتاب کښي کوښښ کړي
چه هغه په داسي روانه ژبه وليکل شي چه زمونږ عوام ته هم داستفادي وړ وي ترڅو د دې
کتاب په لوستلو سره د دوي هم خپل وظيف او مکلفيتونه دخپلي ټولني د بنيادي قشر
د کوچنيانو ، په مقابل کښي درک کړي او د هغوي د مهمت او سلامتيا په برخه کښي د دې
هم پورې برخه واخلي .

څرنگه چه د پښتو په ژبه کښي د کتاب په خپل نوع کښي لومړني اثر دي نو ښکار ده چه د ځينو
نيمگړتيا و او د سهو و څخه به خالي نه وي نو په دې وسيله د محترم لوستونکو څخه احترامانه
هيله کوو چه سهو او نيمگړتياو ته به دا اعتراض په موفد اصلاح او اکمال په بنا به خپل نظريات
لاړ ښووني او پيشنهادات مونږ ته راواستوي ترڅو د بيا چاپ کيدو په صورت کښي هغه په
نظر کښي ونيول شي .

په درنښت .

داکتر تاج الدين «ملت مل»

واکسین او واکسینیشن څه شی دی؟

واکسین : VACCINE :- دا د هغه طبی مواد ونځه عبارت دی چې د هغه د تطبیق څخه د انسان په وجود کېنې (خصوصاً په ماشومانو کېنې) یو ډول داسې مواد جوړیږي چې د خپل مربوطه مرض مکرر زهرجن مواد له منځه وړي او د هغه اثرات خنثی کوي.

یوشمیر خطرناکه ناروغۍ لکه شری (سرځان)، فلج (رکوزن وهل)، نری رنځ (توبرکلوز)، توره قوخلی، تیتانوس، دیفتري او نور شته دي چې په پخوا وختونو کېنې یې زیات شمیر کوچیانو د رنځ، کړاو، مصیبت، بدرانګ والی او حتی د مړینې سبب کېده او په دی ډول د نری ماشومانو ته یې یو عمده کړاو جوړ کړی وه.

تر څو چې په ۱۸۶۹ کال کېنې یو عالم چې Edward Jenner نومیده دا موضوع کشف کړه چې د ځینې مرض وهل شوو کسانو څخه د ځینې نسبي مواد واخستل او د هغه تطبیقول د نورو انسانانو په بدن کېنې د دی سبب کېږي چې دغه نوی کسان د هغې ناروغۍ څخه وژغورل شي. چې په دی وروستیو کلونو کېنې پدی برخه کېنې نور پرمختیام وشوه ترڅو اوسنۍ مادران واکسین تری منع ته واغلل.

په ۱۹۷۴ کال کېنې World Health Assembly په کنفرانس کېنې په کلکه تصمیم ونيول شو چې باید د ۱۹۹۷ کال پوري د نری ټولو ماشومانو ته د نری په ګوټ ګوټ کېنې - واکسینونه په وړیا توګه وروړل شي نو د اپروګرام د

Expanded Program on Immunization (E.P.I) تر نوم لاندې تنظیم شو او دده ټول -

مصارفات او تنظیم UNICEF او World Health Organization په غاړه واخست.

چې اوس د E. P. I. پروګرام په ټولو هی مرکزونو کېنې په وړیا توګه تطبیقېږي چې د اپروګرام ورځ تر ورځ پراختیا مومي.

واکسینیشن VACCINATION

داد هڅې عملې مخه عبارت دی په کوم کښې چې د یو منظم او منبج پروگرام لاندې دیو سیمې ټولو ماشومانو او حتی ښځو ته مختلف واکسینونه تطبیقیزې

واکسیناتور Vaccinator :- د هغه فني شخص مخه عبارت دی چې د - خپل علم په رڼا کښې مختلف واکسینونه په مناسب توګه تطبیقوي

د واکسینیشن ارزښت

لکه چې د مخه مو وویل د واکسینونو کول ستاسې ماشومان د یو شمېر خطرناکه ناروغیو مخه راغوري دکومو ناروغیو له کبله چې زیات شمېر ماشومان شل شي نږدې شي تشنج پیدا کوي او حتی مري. نوکه خپل ماشومان په خپل وخت واکسین کړي، او واکسینونه ورته پوره تطبیق کړي نو خپل معصوم بچیان به د دارنګه ناروغیو د کړاو مخه بچ کړي او که واکسین ورته ونه کړي نو ستاسې ماشومانو ته به د دې ناروغیو د پېښیدو چانس زیات وي چې په صورت کښې به تاسې دلاندې مشکلاتو سره مخ شي.

a :- ستاسې ماشوم به د ناروغۍ له کبله زیات تکلیف تیروي.

b :- د دې ناروغۍ د تداوي لپاره به ستاسې زیاتي پسي لګيږي او وخت به موضوع کیږي په داسې حال کښې چې واکسین همیشه ستاسې سره په نږدې طبي مرکز کښې پیدا کیږي او په وړیا توګه ستاسې ماشومانو ته تطبیقیزې.

c :- ځینې ناروغۍ لکه فلج او شری د ناروغۍ د ختمیدو مخه وروسته ځینې ناوړه اثرات لکه شل والي او برونډ والي او نور پېچلېزې دي چې د واکسین له کبله به دارنګه ناوړه اثراتو مخه ستاسې ماشومان په امان پاتی شي.

میندې د حمل (امیند واری) په موده کښې د خپلې وینې له لارې انتي باډي

(Antibody) (داد مکروب د توکسین څخه د شرغور لویوه وسیله ده چه د بدن له خوا تولید یږي) خپل ماشوم ته نقل کوی او همدا رنگه د ولادت څخه وروسته د ورنزو (تینگ داو لو ورځو شیده) او شید و له لاری خپل ماشوم ته انتی بادی ورکولو چه دغه دمور په بدن کښی جوړی شوی انتی بادی چه اوس د ماشوم په بدن کښی شته ماشوم ته دیو وخت لپاره د مختلفو ناروغیو څخه نجات ورکوی چه د دی انتی بادی د دوام د مودی له مخی مختلف واکسینونه ماشومانو ته د عمر په مختلفو مودو وکښی تطبیق یږي نو په یاد ولری چه دمور شیدی او ورپه د ماشوم لپاره ورکول - فوق العاده ضروری او مهمه خبره ده . ځکه که مور ماشوم ته شیدی ورنکړی نو د ماشوم په بدن کښی به د دارنگه ناروغیو په مقابل کښی معافیت بلکل پیدانشی چه بلاخره د وخت په تیرید و سره وروسته ورو ورو د ماشوم د بدن د فاعی سیستم (د معافیت سیستم) په بدن کښی فعالیږي او د ناروغیو په مقابل کښی یو نوع مدافعوی انتی بادی پخپله په بدن کښی په (Reticulo Endothelial System) کښی جوړیږي چه دغه انتی بادی بیا خارجی عوامل (انتیجن) چه بدن ته داخل یږي له منځه وړي.

نوت :- په یاد ولری چه واکسین هیڅکله د تداوی په منظور نه ورکول کیږي او تنها د ناروغیو په وقایه د مخنیوی، کښی ارزښت لری، خو یوازنی د تیتانوس واکسین په هغه اشخاصو کښی چه پخوانی هم دغه واکسین اخستی وی، د ترافیکي پسینو او ټولوهغه زخمو نو د واقع کیدو په صورت کښی چه ممکن زخم د خاور سره په تماس راغلی وی نو د تیتانوس انتی توکسین چه د Anti Tetanic Serum (ATS) په نوم یاد یږي د تیتانوس د مخنیوی لپاره چه مقداری د 3000-1500 i.u پوره وی د جلدی تست څخه وروسته ورکول کیږي او همدا رنگه د لیونی سپی واکسین Rabies هم په هغه صورت کښی چه په خوړونکي سپی د لیوننتوب اشتباه موجود وی د دی ناروغی د مخنیوی په خاطر د واکسین څو نر قومه د کیډی په عضله کښی ورکول کیږي.

څرنگه چې نړۍ والي همي موسسې تصميم نيولی چې بايد د ۱۹۹۷ کال پورې د نړۍ
ټولو ماشومانو ته واکسين تطبیق کړای شي نو د وروسته پاتې هیوادونو د
ټولو کورنیو د مشرانو همکارۍ په دې برخه کې خورا ضروري اوزیاته
ګټور به ښایسته شي.

خپل ګران ماشومان واکسين کړي ترڅو د خطرناکو ناروغیو ښکار نشي.

معافیت IMMUNITY

د انسان بدن په طبیعي توګه د داسې یو نظم لرونکی دی چې دا نظم فوق العاده مغلق
او پزړی پوهیدل خورا مشکل دی چې دغه نظم د انسان د بدن ساتنې لپاره په دوامدار توګه
او په خود بخودې شکل سره کار کوي چې د دې انتظام یو څه هم مدافعوې سیستم تشکیلوي
چې د دې سیستم وظیفې ته معافیت ویلي شي. نو معافیت د وجود هغه مدافعوې
میخانیکیت دی، په نوم کېني چې بدن ته د هراجنبي جسم (Antigen) د داخلیدو
له کبله بدن د هغه اجنبي جسم د منځه وړلو لپاره یو نوع عکس العمل ښائی چې د دې عکس العمل
په نتیجه کېني د وینې بوشمیر حجرات هغه اجنبي جسم محاصره کوي او بیاني بلع کوي اوله منځه یی وړي او که چیرې
جسم بلع کولو وړ نه وي نو د وینې دغه حجرات بیا دغه اجنبي جسم په محاصره کېني ساتي،
ترڅو په دې طریقې وجود د دغه اجنبي جسم د ضرر څخه وژغوري.

د بدن دغه مدافعوې حجرات زیاده تره په ځنډ دینه، لمغاوی عقداتو، د هډوکو
په مغز کېني او په ریتیکولواند و تیلید سیستم R.E.S. کېني وی.

د حجرات دوه نوعه دي یو نوعه یی غټې غټې حجری دي چې د Macrophage په نوم
یادیږي چې د Monocytes په نوم هم یادېږي او بل نوعه حجرات یی واړ دي چې -

Microphage ګڼلې شي او د Neutrophil Polymorph Nuclear Leukocytes

(P. M. N.) څخه عبارت دي.

نوهغه عملیه چې دهغې په نتیجه کېني اجنبي اجسام وجود ته د داخلیدو په نتیجه
کېني د بدن د بوشمیر حجراتو په وسیله محاصره، بلع اوله منځه یوړل شي دغه

سیستم ته مدافعی یا (Immune System) اودغی مدافعی ته معافیت یا -
(Immunity) وائی .

انتي جن . ANTIGEN :- هر هغه اجنبی جسم چه بدن کښی دمنه
د داخلیدوله کبله انتي بادی جوړېږي د انتي جن په نوم یادېږي .
مثلاً د کلورا ، محرقی ، شری او ځینې نور و ناروغيو میکروبونه . مگر په یاد ولری
چه غذا او ماشوم چه د مور په کیدو کښی وی هیڅکله انتي جن نه دی .

انتي بادی ANTIBODY :- دایو پروتینی ساختمان دی چه په
بدن کښی د انتي جن د داخلیدوله کبله د بدن د مدافعی سیستم یا -
(Immune System) پواسطه جوړېږي انتي بادی د پلازما سیل
(Plasma Cells) پواسطه جوړېږي چه جوړیدل یی لس ورځی څت نستی
انتي بادی د انتي جن سره یوځای کیری او په توگه انتي جن څتی کوی اوله -
مینځه یی وړی .

د معافیت اقسام :

معافیت په دوه ډوله دی .

۱- طبعی معافیت یا : Natural Immunity :- دا هغه معافیت دی
چه په طبعی توگه په ځینی موجوداتو کښی وجود لری . لکه چه چرکان په طبعی
توگه د تیتانوس په مقابل کښی ، سپی او موږگان د توبرکلوز په مقابل کښی او
نلرو خلک د Yellow Fever په مقابل کښی مقاوم و .
د ادول معافیت هم یا : کوچنی والی کښی په طبعی توگه خلق کیری او یا خود

مورد شید و له لاری د مور تخه ماشوم ته انتقال مومی.

۲- کسبی معافیت یا Acquired Immunity :- داډول معافیت
اول په وجود کښی نه وی. او وروسته بیا دیو له خارجي عوامله کبله په بدن
کښی منځ ته راځي.
چه داډول معافیت هم د پیداکیدوله مخی په دوه ډوله دی.

A :- فعال کسبی معافیت Active Acquired Immunity :- داډول
معافیت اول د انسان په بدن کښی د مرض د تیریدو په نتیجه کښی منځ
ته راځي په دی توگه چه د ناروغي انتیجن بدن ته داخلېږي او بدن
دهغی په مقابل کښی انتی باډی جوړوی چه دغه انتی باډی وجود ته
داخل شوی انتی جینونه خشی کوی او همداراز کور وسته بیا د دے
ناروغي بل انتیجن هم بدن ته داخل شي هغه هم خشی کوی اوله منځه
وړي. او په دی توگه یوځل د انتیجن داخلیدل د دغه نوعه انتیجن
په مقابل کښی یو دایمی معافیت منځ ته راوړي.

B - غیر فعال کسبی معافیت Passive Acquired Immunity :-
په دی ډول معافیت کښی د بل چا په بدن کښی د مرض له کبله جوړی شوی
انتی باډی د معافیت د ایجاد په منظور استعمال کیږي مثلاً مور چه دیو
مرض د تیریدوله کبله په خپل بدن کښی انتی باډی لري دغه انتی باډی د
شید و له لاری ماشوم ته انتقال کوی او د ماشوم بدن هم دهغی ناروغي
په مقابل کښی معافیت پیدا کوی او یا دا چه دهغه چا Antisera او یا
Gama Globulin چه مرضی تیر کړی وی د تطبیق پواسطه په بل بدن
کښی د دی ناروغي د مخنیوی لپاره استعمالیږي.

دکسبی معافیت لپاره مختلف واکسینونه په لاندی طریقو تهیه کیری؛

۱- توکساید Toxoid :- د انواع واکسین د میکروبونو د
Toxoid نخه عبارت دی چه د مربوطه ناروغی د میکروبونو ExoToxin
خنثی کوی او عموماً دهغه ناروغی لپاره ورکول کیږی چه انتیجنی
Exo Toxin تولید وی .
هغه واکسینونه چه د Toxoid له نوع نخه جوړیږی عبارت له:
D.T , D.P.T او T.T د واکسینونو نخه دی .

۲- مړه شوی ویروسونه Killed Organisms :- په دی ډول
واکسینونو کبني میکروبونه مړه شوی وی لکن دهغوی انتیجنی خواص
(Antigenicity) موجود وی او په دی ډول تطبیق کول فی په بدن
کبني دانتي بادی د تولید سبب کیږی لکن مرض نه تولید وی او معافیت
منځ ته راوړی چه د Typhoid (TAB) او Para Typhoid A.B
واکسینونه او د کلورا اولیونی سپی (Rabies) واکسینونه دی
جلی نخه دی .

۳- ضعیف کړل شوی میکروبونه: Attenuated Organismes :-
دا ډول واکسینونه ضعیف کړل شوی میکروبونه دی چه د مرض د تولید توان
فی له لاسه ورکړی وی لکن انتیجنیک خواص لری او دانتي بادی د تحریک او تولید
سبب گرځی چه د فلیم (Polio) چیچک (Small Pox)، توبرکلوز
واکسین یا B.C.G، دشوری واکسین او د Yellow Fever واکسینونه د
دی جلی نخه دی .

۴- انتی سیروم Prepared Anti Sera - دایونوع واکسین
 دی چه د Active Acquired Immunity لپاره استعمالیږي .
 چه دا واکسینونه عموماً په بل بدن کېنې جوړ شوی وي . ددی واکسینونو
 وقایوی ارزښت کم دی ځکه چه د دوام موده یی کمه ده . دا د ټول
 واکسینونو په اپیدیمک واقعاتو کېنې چه گڼ خلک په یوه ناروغی اخته وي
 استعمالیږي .

د واکسینشن اهداف

د واکسینشن اصلي هدف دادی چه ده کلنی پورټول ماشومان او د ۱۵ - ۴۵
 کلنی ښځې باید د هغوی د اول ځل مراجعې په صورت کېنې چه صحې مرکز
 ته یی کوی واکسین شي .

او ورسره ورسره د دوی تعقیبي دوزونه او د نورو ماشومانو چه
 واکسینشن دوزونه یی مکمل شوی نه وي د هغوی پاتې دوزونه باید
 مکمل شي ترڅو پدې وسیله مکمل معافیت منځ ته راشي .

د واکسینشن اساسي اهداف دادی چه :

۱- ټولو هغه ماشومانو واکسین کول چه عمر یی د پیدایښت د وخت څخه تر
 پنځه کالو پورې وي .

۲- ټولو هغه ښځو ته د T.T واکسین کول چه عمر یی ۱۵ - ۴۵ کالو وي
 څرنګه چه واکسین کول یو فوق العاده ضروري کاردی نو د پولی کلینک
 ټول مراجعین ماشومان د صفر نه تر ۱۵ کلن پورې او د ۱۵ - ۴۵ کلنو پورې
 ټولې ښځې باید د واکسین کولو لپاره د واکسین شعبې ته ور ولېږل شي .

ترخود نه واکسين بصورت کښي هغوی ته واکسين تطبيق شي. چه البته پدی برخه کښي د کلنیکونو دالتزانو او نور طبي پرسونل مرسته د واکسيناتور سوه اساسي اهميت لري.

هغه واکسينونه چه د E. P. I په پروگرام کښي شامل دي :

اوس د E. P. I په پروگرام کښي ۴ واکسينونه شامل دي چه عبارت دي له :

۱- B. C. G (بي، سي، جي) واکسين :- دا واکسين د توبرکلوز د مخنيوی لپاره ورکول کيږي چه مخفف يې B. C. G دی.

۲- Polio (پوليو) يا د ماشومانو د فلج واکسين :- دا واکسين د ماشومانو د فلج د Polio د مخنيوی لپاره ورکول کيږي چه د پوليو يا Oral Polio Vaccin (O.P.V.) په نوم هم ياديږي.

۳- D. P. T يا Diphtheria Pertussis Tetanus :- چه د دفتري، تورې ټوڅلي او تيتانوس د مخنيوی په غرض استعماليږي.

۴- D. T يا Diphtheria Tetanus Toxoid :- چه د دفتري او تيتانوس د مخنيوی لپاره ورکول کيږي.

۵- T. T يا Tetanus Toxoid :- چه د تيتانوس د مخنيوی لپاره حامله ښځو ته ورکول کيږي.

۶- Measles Vaccine :- دا واکسين د شري يا Measles د مخنيوی لپاره استعمالیږي.

د واکسینشن اقسام

واکسینشن په دوه ډوله صورت نیستی.

- ۱- منظم واکسینشن یا Regular Vaccine Session
- ۲- غیر منظم واکسینشن یا Outreach Vaccination Unit

۱- منظم واکسینشن Regular Vaccine Session: د هغه منظم پروگرام څخه عبارت دی چې تاسې په خپل مرکز کېنې نوی مراجعین او یا د زرو مراجعینو د تعقیبې د وژونو واکسینشن کوی.

۲- غیر منظم واکسینشن Outreach Vaccination Unit: دا د هغه واکسینشن څخه عبارت دی په کوم کېنې چې تاسې د خپل مرکز نه بهر د پخوانی واکسین شوو کسانو د تعقیبې د وژونو او یا د نوو وژنو د تطبیق په خاطر د خلکو کورونو ته ورځئ.

د واکسینشن ټیم ته لارښوونې:

A: د کار د عمومي نظم په برخه کېنې

۱- د خپل کار لپاره باید یو معین مرکز وټاکئ. دغه مرکز باید د سبې ټولو خلکو ته او هم ستاسې لویو مقاماتو ته معلوم وی او هم د خلکو ورتګ ورته آسان وی.

۲- د خپل کار لپاره یو ټاکلی تقسیم اوقات جوړ کړئ چې په دې تقسیم اوقات کېنې باید د مرکز څخه د اکملاتو ورځې او په صبحي مرکز کېنې ستاسې د کار ورځې او په ساحه کېنې ستاسې د کار ورځې روښانه شوي وي.

ددی تقسیم اوقات یونقل خپل مرکزی دفتر ته هم ورواستوی .
 په دی تقسیم اوقات کښی په هفته کښی یو ورځ د مرکز څخه د اکمالاتو
 لپاره وټاکي که دا ورځ د شنبی ورځ وی نویسه به وی ځکه د هفتی پاتی
 پنځه ورځی به تاسی په ساحه کښی منظم کار وکړی .

۳- د خپل مربوطه ساحی یوه مکمل نقشه رسم کړی او په خپل دفتر کښی
 یی نصب کړی او یوه کاپی یی د مرکزی دفتر د معلوماتو په
 خاطر مرکزی دفتر ته واستوی البته تاسی به په دی نقشه کښی
 د سیمې طول او عرض ، شمال ، جنوب ، شرق او غرب روښانه کړی
 او بیا به د ساحی مهم جغرافیوی ځایونه لکه سړکونه ، مکتبونه لوی
 کلی ، جوماتونه ، شفاخانې او ستاسی د واکسین مرکز باید په ټاکلوښو
 سره ښودل شوی وی .

۴- ستاسی د معلوماتو په خاطر او همدارنگه د مرکزی دفتر او ویزیت کونکو
 دلته معلومات په خاطر د خپلی مربوطه ساحی په برخه کښی لاندی معلوماتو
 راټول او په یو جدول کښی درج او په خپل مرکز کښی یی ولگوی .
 ا. د سیمې طول ، عرض ، او مساحت .

ب. د دی سیمې داوسیدونکو ټول شمیر ، په دی سیمې کښی داوسیدونکو
 کورنیو شمیر د ۱۵-۴۵ کلنو ښځو شمیر ، د صفر نه تر ۵ کلنی
 (تره کلنی پوری) د ماشومانو شمیر او د صفر نه تر ۱۵ کلن -
 ماشومانو شمیر .

ج. د دی سیمې لوی او مشهور کلی او هغی کلی د خلکو د تولید او ځایو .
 د مختلفو کلو او قریو د مهمو مشرانو ، ملکاتو ، او ملایانو نومونه
 د معلومات په داسی یو جدول کښی ترتیب کړی .

ردیف	د فنی نوم	د کلی نوم	دا اجتماع خای	د ملک ، امام او مشرانو نومونه	د فنی نوم	د تول نوم	د او وسیله	د فنی نوم	د فنی نوم	د فنی نوم
۱										
۲										
۳										

۵ :- د خپل مرکز تول فنی او غیر فنی وسایل او سامان آلات په یوه راجستر کښی درج کړی او کله کله هغه موجودی کوی چه پوره او د استفادی وړ وی . خراب او د استفادی نه وتلی سامان آلات فوراً مرکز ته ولیږی او په عوض یی نور نوی سامان واخلي .

۶ :- فنی سامان آلات درست استعمال او د استعمال نه وروسته یی په مناسب توگه پاک ، صفا او په محفوظ خای کښی خای په خای کوی او هره ورځ سهار دغه سامان آلات چک کوی چه پاک درست او د استفادی وړ وی او د کار په ختم کښی بیا دغه سامانونه موجودی پاک او خای په خای کړی .

۷ :- خپل د کار میز په شاوخوا د خلکو د بیخایه بیرو بار او گشت او گذر اولاس وهنی نڅه مخنیوی وکړی .

۸ :- د عملی کار په برخه کښی خلکو ته د ښه لارښوونی وکړی ؛

۹ :- د مرکز په شروع کښی د سیمې د مسئولینو آمرانو او حکومتی مامورینو او د اکثرانو په مرسته د سیمې تول ملکان ، مشران ، سپین زیږی ، ملایان ، او حتی د امکان په صورت کښی عوام هم راوغواړي . دوی ته د واکسینونو ارزښت په روښانه او ساده الفاظو کښی بیان کړی او د دوی نڅه خواش


ڪرل شوی دے نو خلك ۽ واکسين کولو په خاطر تشويق ڪري اود دوی
په ذريعه خلکو ته د واکسين دار زبنت په برخه کښي معلوما تونه ورسوی چه دا خلک
به بيا ستاسي د ورتللو په وخت کښي خلک تاسي ته راټولوی اوهغوی ته به د واکسين
تطبيق کولو، نظم سائلو اوهمکاري کولو نصيحت اولار ښونه کوی اوستاسي دکار
په ورځ بايد دهغه کلي ملک، ملا اونور مشران ستاسي سره دهمکاري لپاره
حاضروي.

b په هرکلي کښي د واکسين کولو په وخت کښي تاسي لمړي يوه ورځ مخکښي د
کلي ملک مشرانو اولامام ته خبر ورکري چه دهغوی دکلي خلکو ته خبر
ورکري چه سبا ورځ دستاسي د ورتللو لپاره هغوی آماده اوهغوی ماشوما
هم په کورونو کښي موجود اوسني.

c کله چه تاسي کلي ته ورغلي نولمړي دکلي ملک، ملاامام اومشران پيدا ڪري او
دهغوی په مشوره د واکسين کولو لپاره خلک دکلي د اجتماع ځايو ته لکه
جومات، دير، حجره اويامکتب ته راوغواړي. اوچه کله خلک راغونډ شول
نولومړي خودقيقي دوی ته د واکسين داهيت په برخه کښي په ديره عاميانه
ژبه خبري وکري اود واکسينونو پوري مربوط ځيني تصويرونه اوچارټونه
چہ تاسي سره وي هغه خلکو ته ورښکاره اوتشریح ڪري.

خلکو ته دهغه ناروغيو خراب عواقب ورپه گوته ڪري اوتصويرونه
ورته وښايي چه دکومو ناروغيو مخنيوی د واکسينونو پواسطه
کيدايم شي. اودخلکو ته ووايي چه که تاسي خپل ماشومان اوشعې واکسين کري
نوستاسي ښي او ماشومانو به د دغه نوع خطرناکه ناروغيو لکه شري، کوی
فلج رشل والي، کونيوالي اونورو معيوبتوانو څخه خلاص شي. لومړي شکل
الته دوی ته دا ويل هم ضروري دي چه واکسين کول ستاسي لپاره په وينا

دغه سړی دیولیو (د ماشومانو نلچ) د ناروغی له کبله شل،
او معذور شوی دی.



(لومړی شکل)

که ده ته په مناسب وخت (کوچینوالی) کښی دیولیو
واکسین ورغړل شوی والی، نودی به
ددی ناروغی له کبله شل شوی نه وه.

توگه تطبیق کیری همداراز خلکوته وویل شی چه د واکسین خلورد وری پوره
کول خورا ضروری خبره ده. چه باید د بیا راتللو په وخت خپل ماشومان دبیا
واکسین کیدو لپاره تاسی ته را ولی. حکه چه نیمگری واکسین کول اویا خو-
محدود واکسینونه تطبیقول ماشوم ته پوره محافظت نشی ورکولای.
همدارنگه د واکسینونو د وودوزونو ترمنځ موده چه حداقل یو میاشت ده اونریات تر
زیاته داموده باید دیوکال څخه زیاته نشی او د آخری یا بوستردوز وخت د دریم دوز
دیوکال ورسته وی چه داموده هم باید په اعظمی توگه د ۴ کلونڅه زیاته نشی.

d: ځینی میندی په یوځل د څو واکسینونو د تطبیق څخه داریری نو هغوی ته -
دی په روښانه الفاظو کښی وویل ښکې که چیری دوه، دری یا څلور واکسینونه
یوځای ماشوم ته ورکول کیری کوم پروانلری.

e: خلکو ته دی وویل شی چه کوشش وکړی چه دیوکور ټول ماشومان په ځل
تاسی ته را ولی او ټول د واکسین وپه ماشومان او مورگانو کوشش وکړی
چه په مسلسل توگه په یو یا دوه کارتونو کښی راجستړ شی. البته داکار هم د -
کورنی لپاره او هم ستاسی د کار لپاره دیر آسانتیاوی برابر وی دیوی کورنی
لپاره د زیاتو کارتونو جوړول ستاسی لپاره هم تکلیف دی او سائل فی د کورنی
لپاره هم د تکلیف سبب کیری.

f: د کورنی مشری یا مشری ته کارت و سپاری او ورته سپارښتنه وکړی
چه داکارت په یو پلا سټیک لفافه کښی تاواو په کور کښی په یو موندوق کښی خوندي
وساتی او په کارت کښی شامل ماشومانو د هر یو د ناروغه کیدو په صورت کښی داکارت داکتر
ته بنای او د بل ځل واکسین کولو په وخت کښی هغه له ځان سره تاسی ته راوړي.

g: د کوچنیانو خپلوان مشران په دی پوه کړی چه دی واکسین کولو څخه وروسته

حُنی اعراض او علایم لکه تبه د پیچکاری د خای دانی دانی کیدل او نور کیدای شي چې پیداشي
نوداکوم مرض ندي او دوی دی د یو ته نه وار خطا کینی بلکه دا د وجود یو طبیعي
عکس العمل دی چې بیرته پخپله بنه کینی او باید هغه ته د تکرور کولو، —
پانستان کولو او دوا ورکولو څخه ډډه وکړي او که دغه عکس العمل ډیره شدید
وه نو ورته ووايي چې بیا تاسی ته مراجعه وکړي او یادی د کار سره ډاکتر ته ور
شي او ډاکتر ته دی هم ووايي چې دغه ماشوم ته د واکسین نه وروسته تکلیف
پیدا شوی ترڅو ډاکتر هم دی خبری ته متوجه شي .

۱. که اختلاطی ماشوم ئی تاسی ته راوړ نو لومړی وگوري چې اختلاطی څه
او د اختلاط شدت اندازه څومره ده . او بیا د هغه د اندازی په تناسب
اجرات وکړي مثلاً که د واکسین کولونه وروسته ماشوم ته تبه پیداشوی
وی که تبه د ۱۰۱۴ څخه کمه وی هیڅ دوامه ورکوی او که د ۱۰۱۴
څخه زیاته وه نو بیا ورته پاراستامول یا اسپرین توصیه کړي او که د
ماشوم اختلاط حساسیت یا Allergy وی نو عاجلاً ماشوم ته $\frac{1}{12}$
Adeenaline محلول څخه یو سی سی د پوستکي لاندی ورکړي او ماشوم خپل
د سیمې مربوط ډاکتر ته واستوی او ورسره لیکلې پاڼه ورکړي چې
ماشوم ته موکله او کوم واکسین کړی وه او عکس العمل ئی څه وه او کومه
دوا مو ورته څه وخت تطبیق کړي او څومره مو تطبیق کړی ده .

۲. د هر ځل واکسین کولو څخه د څه خلک سره راټول کړي او د نورو مهمو خبرو
په خواجنی داهم ورته په روښانه ټکو او د دوی په مروجی ورځو سره
ووايي چې د بل ځل واکسین لپاره بیا تاسی په کومه ورځ کومه نیټه او د نن څخه
څو ورځې وروسته بیا راځی ترڅو خلک ستاسی د بیاراتللو
پروگرام څخه خبر او ستاسی راتلونته آماده اوسی .

مگر متوجه اوسی چه تلونکی نیته د جنتر حاله معنی و د کیری چه رختی د ورخی
او اوسه ستاسی د اکمال اتود ورخی سوسه و نه خوری . خلکو ته به د اهم و وایی چه
که اسیانا د کوم معذرات په وجه مونږ په تالکی ورخ ا نغلو نویادی دیونفر
پواسطه د وی ستاسی د مرکز سوسه رابطه ونیستی چه تر خورته بله ورخ په
نښه کړی .

C: د کار په عملی برخه کښی د واکسینا توره مکلفیتونه:
د اکمالا تو په برخه کښی :
هر واکسینا تورد خپل مرکز لپاره لاندی سامانونو ته ضرورت لری .

A: قرطاسیه :

1. Daily Register Form ورخی راجستر ۲ جلد
2. Permanent Register Form دایمی راجستر ۱ جلد
3. Vaccination Cards Form AR/7 د واکسینشن کارتونه
4. Monthly Immunization Return Form AR/11 د میاشتني راپور پانی
5. Inventory Sheets د واکسین د موجودی پانی
6. Forms used in Manitoring E.P.I.
7. Vaccines & Supplies Control Cords
8. Vaccines Request Forms
9. Cold Chain Performing Reports
10. Defaulter List
11. Monthly Surveillance Report
12. White Sheets

سلمان COLD CHAIN

1. Refrigerator
2. Cold Boxes
3. Vaccine Carrier
4. Thermos Flask
5. Thermos
6. Ice Packs
7. Thermometer
8. Temperature Indicator
9. Cold Chain Monitor

- ۱- یخچال
- ۲- یخ بکسونه
- ۳- واکسین کیئر

میتفرقه سلمان آلات :

1. Syringes 1.2 cc .Omega 1cc B.C.G. Syringes
2. Needles
3. Spirit
4. Spirit Lamp
5. Pens and Pencils
6. Sterilizer
7. Cotton
8. Tables, Chairs
9. Anti Pyretics
10. Inj. Adrenaline
11. Different Vaccine
12. Diluent for B.C.G.
13. Diluent for Measles Vaccines

د واکسيناتو مهمه وظايف :-

- ۱- د واکسينونو حاصلول او صحیح ساتل 1- Obtain Vaccines
 - ۲- د سامان تمهيه کول 2- Maintain Equipment
 - ۳- د واکسينونو ورل او تطبيقول 3- Handling Vaccines
 - ۴- د مياشتني راپور جوړول او د ريكارډ برابرول
- الف: د واکسينونو حاصلول او د واکسين ديمانډ :-

۱- د واکسين د ضرورت وړ مقدار سنجش کړي او د Vaccine Demand List ترتيب کړي.

د واکسين د ضرورت وړ مقدار په دوه ډوله سنجش کېږي.

a: که ستاسې خپل مرکز ته پخوا هم واکسين راوړي وی نو د تيرې مياشت د مصرف او پس اندازه په نظر کېني نيولوسره چه کوم واکسين څومره لگېږي او څومره شته نو متبقي مقدار او د ذخيرې لپاره مقدار سنجول کېږي او راوړل کېږي.

b: که ستاسې مرکز بلکل نوی وی نو پدې صورت کېني ستاسې واکسين د مقدار د سنجولو لپاره د لاندې معلوماتو نو ضرورت دی.

۱- د سيمې نفوس څومره دی ؟ Total Population

۲- د مربوط واکسين لپاره د مساعد تاخلي گروپ ماشومانو د معلومولو لپاره

د تولد فيصده څومره ده ؟ Birth Rate

۳- د Expected Coverages اندازه ريعني ستاسې په خيال څو فيصده ماشومان واكسين کړي شي؟

۴- په يو کال کېني د دې واکسين خود وزونه ورکول کېږي ؟

۵- Wastage Rate يا د ضايع کيدونکي واکسينونو اندازه چه دغه

اندازه نظر هر واکسين ته فرق کوي خو په عمومي صورت د B. C. G. او -

Measles واکسینونو ضایع کیدونکی اندازنه ۰.۷۵ اودینورو واکسینونو

ضایع کیدونکی اندازنه ۳۴٪ اتکل کیری .

- ۶- تاسی پدیو کال کینی خوخلی واکسینونو راویری ؟
- ۷- د اضافی ذخیری مستاتلو اندازنه .
- ۸- هر ویال خود وزه کیری اوستانی د ضرورت ورد وزن خو ویاله کیری .
- چه د پورته شیانو د معلومولو په ضرورت کینی بیامونو اوتاسی کولای شو چه د ضرورت ورو واکسین په خپل دیمان کینی معلوم کړو .

د مثال په ډول د B.C.G. واکسین د مقدار معلومولو لپاره که په

۱- که د سیمې نفوس ۱۰۰۰۰۰ کس وی $P = 100000$

۲- که د زیږیدو اندازنه ۳۵/۱۰۰ وی پخه دیرش فی سال $\text{Birth Rate} = 35/100$

۳- که د واکسین تطبیق توقع ۶۰٪ وی $\text{Expected Coverage E.C} = 60\%$

۴- که هر کال کینی یو ځل وراکول کیری $\text{Doses/year (D.Y.)} = 1$

۵- که د خرابیدو اندازنه ۵۰٪ وی $\text{Wastage Rate (WR)} = 50\%$

۶- که په کال کینی ۱۲ ځله واکسین راوړی $\text{Vaccine Supply (vs)} = 12/\text{year}$

۷- که د ذخیری واکسین اندازنه ۲۵٪ وی $\text{Reserve Store} = 25\%$

۸- که یو بوتل ۱۰ لس دوزه وړ کړی $\text{One Vial} = 10 \text{ Doses}$

$\therefore P = 100000$

$BR = 35/100$

$\text{No. of Child} = \frac{100000 \times 35}{1000} = 3500$

$E.C = 60\%$

اود واکسین کیدونکو ماشومانو شمیر

په عملیت وکړی له $3500 \times 60 = 2100$

$\text{No. Child that can be Vaccinated} = 2100$

$$\text{Dose/year} = 1$$

$$\text{Total Doses} = 210 \times 1 = 210$$

can be vaccinated

به طول کال کسینی به تطبیق و بر دوز و نه

عبارت وی له .

$$\text{W.R} = 50\% = \frac{210 \times 50}{100} = 105$$

د دی واکسین ضایع کیدونکی مقدار به عبارت وی له .

$$\therefore \text{Total Doses for this year} = 210 + 105 = 315$$

به طول کال کسینی د ضرورت و نه

ام دوز و نه به عبارت وی له :

$$\text{V.S.} = 12 \text{ Times/year (Month)} (\%)$$

$$\text{V.S. for each time} = \frac{315}{12} = 26.25$$

نوبه ځل کسینی د ضرورت و نه واکسین دوز و نه =

او د هر ځل لپاره به د څیړنې مقدار عبارت وی له

$$\text{Reserve stock for each month} = 25\% = \frac{26.25 \times 25}{100} = 6.56$$

نوده ری میاشتی لپاره به د راوړنکو دوز و نه تعداد عبارت وی له :

$$\text{Total demand doses for one month} = 26.25 + 6.56 = 32.81 \text{ Doses}$$

$$\text{one vial} = 10 \text{ Doses}$$

هر ویال لرونکی د ۱۰ دوز و نه وی

$$32.81 \text{ Doses} = \frac{32.81}{10} = 3.2 \approx 4 \text{ vial}$$

نوټول ضرورت و نه ویالونه به عبارت وی له :

۱- همدا راځي T.T. واکسین د حامله ښځو په شمیر یاد ۱۵ - ۴۵ کلنو ښځو په شمیر او

۲- ۱۵ - ۴۵ کلن ښځو په شمیر ښځو لیکښی .

۳- بیا د ځپل مرکز څخه د ځان سره د دی واکسینونو د انتقال سامان آلات تهیه کړي

۴- اوله ځانه سره فی یو ټی .

۵- کله چه واکسین اخلي نو د هغه مقدار تعداد د هرونوع تعداد بیل بیل د لست

سره سر ورکړي چه پوره و نه .

۶- د هر واکسین د هر ویال لپاره د هغه تاریخ چک کړي چه تاریخ پوری تیر

شوی نوی یانې تاریخ دیر نږدی نه وی .

۷- د هر ویال ټنگ او قوام کنترول کړي .

۸- همدا راز د محلات هم چک کړي چه ستاسی د لست سره برابر وی .

- ۷- ځان دوا ګڼن دانتهال او په هې مرکز کېنې دهغې د ساتلو په اصولو بنه پوه
کړې او هېڅ شې ځانته مجمول مه پرېږدي .
- ۸- د واکسین نه علاوه نور د ضرورت وړ سامان آلات هم د خپل لست له مخې په
پوره حوصله ترلاس کړي .

ب: د واکسینونو انتقال لپاره د سامان آلاتو تمه کول:

(MAINTAIN EQUIPMENT)

د واکسین د انتقال لپاره لاندې سامانونه په کارېږي .

a- COLD BOX

b- VACCINE CARRIER

c- FLASK


d- ICE PACKS

دغه سامان آلات واکسین یخ ساتي او د دې منظور لپاره پکښې ICE PACKS
ایښودل کېږي .

واکسین موچه ځله واخستل هغه په دې وسایلو کېنې درېست ځای پر ځای کړي
دا موضوع په ۱۳ مخ کېنې وګوري بیا د واکسین د انتقال وسایل د لمر د رڼا -
نڅښت و ساتي (و شریخی خپل مرکز ته کوم وسیلې پواسطه او په لنډه لاس انتقال کړي
خپل د ضرورت وړ شیان په پوره حوصله او استقامت د خپل لست له مخې سره
راټول کړي او خپل مرکز ته یې راوړي .

د د خپل ځلو په ساحه کېنې راوړل شوي سامانونه د لست سره سم موجود
کړي او واکسینونه په یخچال کېنې د حرارت د درجې په تناسب د موضوع
په ۱۴ مخ کېنې وګوري ، کیږي . د یخچال د استعمال هدایت پوره ولولي
او هغه عملی کړي خولاندې ټکي هم په نظر کېنې و ساتي .

- ۱- یخچال امتحان کړی چه درست کار کوی یا نه؟
- ۲- یخچال لمر ته نه وی او یا هم بخاری او منقل سره نژدی نه وی.
- ۳- یخچال هموار ایښودل شوی وی او کوږ نه وی. عمود وی او مایل نه وی. اما ددی لپاره چه یخچال دروازې بند و سائل شي او واکسین هم تری راتوی شي نو که یخچال لږ شاخو ته کوږ (ستایل) وی ښه به وی.



۴- یخچال باید د دیوال څخه اقل ۱۰ یو فٹ مسافه ولری.

۵- د یخچال په ټولو حصو کښی باید یو یو ترمایمتر یا ترمایمتر اندیکیتر — کښودل شي ترڅو د هغی پواسطه وخت په وخت د یخچال د مختلفو برخو د حرارت درجې معلومی کړای شي.

۶- وخت په وخت یخچال کنترول کړی چه کار کوی او نه؟ او هم د یخچال د ښه ترمایمتر و نو په ذریعه حرارت کنترول کړی و چوری چه برق قطع شوی نه وی. او یا یخچال خراب شوی نه وی او یا که هوا په پیره گرمه وی او یخچال مناسب یخ حرارت نشي ساتلای نو بیا ورسره یو ځای ایو کښی یشن یاد او بو پکي او یا هم د ودریدونکي (استیند والا) پکي نه په استفادی سره کوښښ وکړی ترڅو چه یخچال مناسب یخ حرارت پیدا کړی.

۷- که یخچال خراب شوی وی او یا برق قطع شوی وی نو پدی صورت کښی د یخچال د ښه د مختلفو برخو ترمایمتر و نو چوری چه د ضرورت وړ درجو څخه خوریا شوی نه دی که زیات شوی نه وی نو عارضه اصلاح کړی او نور کوم فرق نه کوی او که د یخچال د ښه حرارت د ضرورت وړ اندازې څخه څه زیات وه نو بیا و چوری چه ددی عارضی څخه به څومره وخت تیر شوی وی.

که پوه شوی چه داوخت ده ساعتو څخه کم دی خو پروانه کوی او واکسین
بیا هم داستفادی وړدی حکم هغه د پنج پارچې چې د یخچال کښی شته هغه
هم واکسین ده ۱ ساعتو پورې ساتی او که داوخت ده ساعتو څخه زیات وی نو بیا
دا واکسین به خواب شوی وی هغه بیکه کړی او مه یی استعمالوی

۸- : که چه یخچال کښی واکسین ایښودل شوی وی دهغه دروازه شراشر
مه خلاصوی او هم دغه یخچال د خښلولو د اوبو او نورو مقصد ونولپاړئ
مه استعمالوی. او هم چه یخچال دروازه دکوم ضرورت په منظور خلاصه
کړی هغه زیات وخت خلاصه مه پرېږدی او ژر یی بنده کړی دسروازی د
بندیدو په وخت کښی توجه وکړی چه دروازه موده رسته بنده کړی وی.

۹- : د تعقیم کولو څخه وروسته سرخونه او ستنې بیرته یخې کړی او د واکسین کولو
په وخت کښی څرم سرخه او څرمه ستن مه استعمالوی.

۱۰- : د هر واکسین لپاره بیل بیل سرخ استعمال کړی او حتی د سیروم لپاره هم بیل
سرخ استعمال کړی. د استعمال په وخت کښی باید د سیروم د حرارت درجه هم
۴+ - ۸+ درجه د ساتی کړید وی.

۱۱- : واکسینونه هیڅ وخت یوځای کښی نه بلکه هر واکسین بیل بیل او په جلا
جلا سرخ کښی تطبیق کیدی.

۱۲- : د هر واکسین د تطبیق څخه مخکښی دهغه تاریخ ، رنگ او قوام
کنترول کړی. چه رنگ یی بدل شوی نه وی قوام سخت شوی نه
وی تاریخ پرې تیر شوی نه وی او بایی د شروع د ورځی څخه تر اوسه پورې

پری دلزوم نه زیاتی ورخی تیر شوی نه وی (مک مخ و کوری)
 اوهم خان پوره مطمئن کرے چه دا واکسین چیرته دینچال
 نه بهر سائل شوی نه وی .
 هپخکه شکمن واکسین استعمال نکرے .

۱۳- : د هر واکسین د تطبیق مخه د مخه دهغنی په مضاد استطبایاتو
 باندے خان پوه کری حکه چه مختلف واکسینونه په مختلفو وختونو
 کبني مضاد استطبایات وی . (مک مخ و کوری) .

۱۴- : د واکسین کولو مخه د مخه لمری د یوی کورنی ټول ماشومان
 په دایمی راجستر کبني ورسوی دهغه نه وروسته
 د دوی نومونه په کارت کبني ورسوی اوبیا د
 کارت له مخه دهغوے نومونه په ورخني راجستر کبني
 داخل کری او د دوی د عمر په تناسب د ضرورت وړ
 واکسینونه ورته په دایمی راجستر کبني او په کارت
 کبني د تاریخ په لیکلو سره په نښه کری اما په ورخني
 راجستر په هغه مربوط خانده کبني به ورته صرف تطبیق
 کیدونکي دوز علامه ولیکي (✓) .

(د راجستر کولو طریقه په مک مخ کبني و کوری)
 اوبیا د کارت له مخی منظم یویو ماشوم راوغواری او
 واکسین ورته وکری .

په دی برخه کبني زیات دقت او توجه پکار ده حکه دنده راجستر
 کولو په صورت کبني واکسین کول د واکسین د تکرار کیدو

سبب او راجستر کول اما واکسین نذکول د واکسین د پاتی کیدو
سبب کیدی نو باید په پوره غور سره ټول هغه واکسین چه په
نسبه شوی وے تطبیق شی .

۱۵- : دهری ورځی په شروع کینی خپل د ضرورت وړ واکسین
راواخلي او هغه په ترموز ، فلاسک او یا هم د یخ د-
پارچوله پاسته کیدی . دهر واکسین د شروع سره
سم په هغه باندے د شروع تاریخ ولیکي .
او چه هر یو دوز د هغه څخه اخلي نو په بوتل فی بوخط
کش کوے ترڅو د ورځی په ختم کینی تاسی ته د-
استعمال شوو دوزونو او پاتی دوزونو معلومات وشي .

۱۶- : دهری ورځی په شروع کینی اول وچوری چه که استعمال
شوی واکسین چه څو دوزونه فی پاتی وی او خراب شوی
نه وی ، نو لمړی همدغه واکسین مصرف کړی او
چه کله دغه واکسین خلاص شو نو بیا بل نوی بوتل شروع
کړی .

۱۷- دهری ورځې د عار په ختم کېږي د B. C. G او MEASLES دواکسينونو پاتې شوي مقدار بیکار کوي او هغه سوځوي ځکه دا بېلې ورځې ته د استعمال وړ نه وي. ۱۰ اونور واکسينونه د شروع د ورځې څخه تر دوهمې ورځې پورې د استفادې وړ وي او بايد د دوهمې ورځې نه پس پاتې مقدار بیکار شي.

۱۸- د واکسينونو ځواب مقدار او هڅې د هغې تش بوتلونو سرچونو ستنې او ځواب شوي واکسينونه مری خواته مه غورځوي بلکه هغه بايد په اور کېني و سوځول شي ځکه واکسينونه ټول ویرستونه دي او ممکن د ناروغیو د خپریدو سبب شي.

۱۹- تاسې هم بايد پوره ياست او د ماشوم خپلوان هم په دې پوره کړي چه واکسين صرف و قايوی ارزښت لري او د علاج په منظور نه ورکول کېږي.

نو ځکه بايد د واکسين د کولو څخه د څه ترې پوښتنه وکړي او وگوري چه ماشوم کومه شديد سو تغذي ونلري او که و افيم تو بر کلوزولري نو B. C. G ورته مه ورکوي او بايد اختلاج ونلري. انټي بيوتيک يا Corticoid دواوې خوندي اخلي که اخلي بيا واکسين ورته مه کوي.

۲۰- دهری ورځې په ختم کېږي خپل سامانونه چک کړي چه پوره وي او پاتې واکسينونه د D.T. & T.T., D.P.T., POLIO بېرته په خپل مناسب ځای کېږي دې او د ورځني کار خلص لپور په ورځني راجسټر کېږي وليکي.

۲۱- واکسيناتور بايد ټول سيمينارونه، کنفرانسون او هدايات چه دوی ته ورکول کېږي جدې او په پوره توجه سره مراقبت کړي او ټول نوي هدايات بايد د ځان سره په مخصوصه کتابچه کېږي يا داشت واخلي.

۲۲- : واکسینا تور باید د میاشتی یو ځل ټول مربوط کتابونه ، د هماغوی او خپل د یاداشت خصوصي کتابچه او د واکسینشن پوری مربوط نور معلوماتونه میاشت په میاشت ولولی او ځان پری پوه کړي او د هغی سره سم رفتار او اجرات وکړي . تر څو ځنی شيان د هغه له یاده ونه وزی .

۲۳- د میاشتی په ختم کښی میاشتی راپور د واکسین دیماند لست ، Defaulter List او Monthly Surveillance Report ترتیب او یو نقل خپل دفتر کښی وساتي او یو نقل خپل مرکزی دفتر ته ولیږي .

د واکسینونو ذخیره کول ، اخستل ، انتقال او سائل ځی په ساحه کښی

ټول واکسینونه د ۸ ° فجه په زیات حرارت کښی له منځه ځي نو د ګډل کېده د - واکسینونو په سائلو نقلولو او حتی د استعمالو په وخت کښی د دی موضوع خاص مراعات کول ضروری خبره ده نو لدی کېده واکسین په هر ځای کښی او همیش پیاړ په مخصوص سامان آلاتو کښی یخ سائل کیږي چه د غی طریقې ته Cold Chain ویل کیږي . په Cold Chain کښی دیر سامان آلات شامل دي چه مهم ځی دادي :

یخی کډو Cold Room - ثور یخ چالونه Deep Freezers


یخی چالونه Refrigerators - یخ بکسونه Cold Boxes - لکه

Swedish Cold Box , Cold Man Cold Boxes

ICE PACK - THERMOS FLASK - VACCINE CARRIER


چه مختلف واکسینونه په مختلفو درجو کښی په لاندی ډول سائل کیږي .
پوازی Polio Vaccine باید یخ (او منجمد) وساتل شي یعنی یوازې

Polio په Deep Freezer کښې ساتل کېږي او چه کله د Polio واکسين
 غیر منجمد شي نو باید په ۳ ورځو کښې د منډه د منډه یا استعمال شي او یا دی د ویاړه
 منجمد کړای شي پولیو د پنچال په پاس خانه کښې ایښودل کېږي
 په پنچال کښې هم Measles او B.C.G واکسين د $0 - 2$ سانتي گرید په حرارت
 کښې د پنچال د وهمه خانه کښې ساتل کېږي په داسې حال کښې چه
 D.P.T, D.T او T.T واکسينونه $2 - 8$ درجه سانتي گرید کښې
 د پنچال لاندې خانه کښې ساتل کېږي
 اودغه واکسينونه باید هېڅکله هم منجمد نشي چه داموضوع دانتقال په وخت
 کښې هم باید په کلکه په نظر کښې ونیول شي.
 همدا راز په لنډه توچه ویلي شو چه Coldroom, Deepfreeز او Refrigerator
 د ذخیره کولو په منظور، COLD BOX او VACCINE CARRIER
 د انتقال په منظور، او thermos flask د استعمال په وخت
 کښې د ساتنې په منظور استعمالېږي.
 همدا رنگه په cold box کښې د انتقال په وخت کښې په بیخ کښې باید -
 اول Ice pack لاندې




د وهم شکل،
 په کولم بکس کښې د یخ د بستوا واکسينونو
 د ایښودلو طریقه :

رد دوم شکل پاتی بر خه



(۴)



(۵)

اوخلور خواو ته کینودل شی اوپری Measles, Polio او B. C. G کینودل شی .
او بیاپری Icepack کینودل شی اود Icepack لپاسه کاغذی گته کینودل
شی او بیاپری T. T. , D.P.T او D.T واکسین کینودل شی نوخود غه ورستی
دری واکسینونه دمنجید کید و نخه وسائل شی دغه طریقه باید هر چیرته به
نظر کینی وی .

Measles او B.C.G واکسین باید د مربوط محل پوا، طه حل کرای شی اود حل کید
نه پس ژر باید تطبیق شی او همدارنگه محلولی هم باید گرم نه وی یعنی د حرارت دجه
فی باید $4 - 8$ درجه سانتی گرید پوری وی حکه گرم محل هم واکسین
تخییوی اوله منجه فی وری .

که د B.C.G واکسین تیار شونوپه 4 درجه سانتی گرید کینی د $4 - 6$ ساعتو
دوام کوی او باید ددی وخت نه زیات وروسته استعمال نشی .

همداراز د Measles واکسین چه تیار شی باید په 4 ساعتو کینی دمنه دنده یا استعمال
شی او یا په یخ حرارت کینی وسائل شی .

کوشش و کړې چه صرف دیوی ورځی لپاره واکسین د Vaccine Store څخه واخلي او استعمال ئی کړي او هغه هم په Cold Box کښی یوئتی .

Cold Box به هم تر ټر ټر نه خلاصوی او هم به سر خلاص نه پرېږدی او د ورځنی استعمال لپاره به واکسین د Cold Box څخه Vaccine Carrier ته انتقال کړی .

او ورځنی واکسین به د V.C. څخه استعمالوی فکر وکړي چه V.C. مو د یخ د پارچو پواسطه یخ کړی وی . هغه واکسین چه تاسی ئی ممکن ۱۰-۱۵ دقیقو کښی استعمال کړي نو هغه په صرغ کښی واچوی او یخ د پاکټونو لپاسه ئی کیږدی .

د Polio واکسین د قطره چکان پذیر یه د ماشوم په خوله کښی واچوی لکن احتیاط وکړي چه قطره چکان بوتل د ماشوم د شونډو او خولی سره په تماس رانشی .

هغه واکسین چه استعمال شوی وی او یو څه بوځدی پاتی وی باید د عاریه ختم کښی له منځه و یوړل شی او که د هدایت سره سم د یخ سانلوسیتسم مراعات کړی وی نو د ورځنی په ختم کښی هغه ویالونه چه استعمال شوی ندی . بیرته کولر بکس یا یخچال ته یوسی او هلته واکسین بیرته یخچال کښی کیږدے .

ددی لپاره چه واکسین مو نبات ضایع نشی کوشش وکړي چه دیو نوع واکسین د بوتل د شروع کولو څخه د څه څو تنه ماشومان چه عین واکسین اخلي سره راجع کړی او بیا بوتل خلاص او گډی کړی ترڅو په یو ځل دیر ماشومان تری واکسین شی او دیو یادو وکسانو د پاره ټول ویال خراب نشی .

د مرکزي گودام څخه د واکسین اخستل او د واکسین د پیمانې:

تاسی د واکسین اخستلو په منظور د مرکزي گودام څخه باید خپل لست چه په هغه کښی د ضرورت وړ واکسینونه اوده واکسین په مقابل کښی تاسی سره موجود د واکسین مقدار او نور مقدار چه تاسی ئی غواړی لیکل شوی وی (د واکسین د دیمانند فورمی په ۷۱ مخ کښی وگوري) تیار کړی . سره لدی چه په عمومي توگه واکسین مقدار د ماشومانو په تعداد د واکسین د اکمال په موده او د کار په انتظام پوری اړه لری . خود دی سره سره هم تاسی د تیری میاشتی د مقدار

له مخې هم پوهيدای شي چه کوم کوم واکسين په څه څه مقدار راوړي . خو بيا هم دغه طريقه په نظر کيښي نيول به چه په ~~عکس~~ مخ نيول شوی ده ، ناسی سره کوک وکړي .

لنډه داچه واکسين د اصل مقدار څخه زيات واکسين راوړل کيښي که د واکسين مقدار زيات وي ښه ده خو چه کم نه وي . نو په دې ترتيب به ناسی د هر واکسين د ضرورت مقدار وليکي اود هغې د راوړلو په خاطر به د انتقال وسايل Cold Box يا Flask له ځان سره يوسي بيا واکسينونه د محلات ي په Cold Box کيښي درست ځای په ځای کړي . په دې ټول چلند د اوڅلور خزانو Ice pack کيښي او په منځ کيښي د BCG, Measles, Polio واکسين کيښي او پري لپاسه هم Ice pack کيښي او بيا د هغه لپاسه کاغذي گټه کيښي او د دې گټې لپاسه بيا په تماس لاشي او بيا هغه داسي پټ کړي چه د لاس وړانگي وروڼه د سين ي او بيا په ممکنه اندازه په ديوه سرعت سره هغه خپل مرکز ته انتقال کړي . کوم ښه موېسته بندي کړي وي نو واکسين ممکن تر څو ورځو هم خراب نشي لکن د انتقال د وسايلو په منځ کيښي هم بايد د پنځ پارچې Ice Bx (پښودل شوی وي) (هدايت وکړي) او هم د انتقال په وخت کيښي خوش وکړي چه واکسين لمونډ نه وي .




د واکسينونو د انتقال د وسايلو په برخه کيښي لنډه معلومات :

A - COLD BOX :-

استعمال ي :-

- a : د ستور څخه د زيات مقدار واکسين داخستلو لپاره .
- b : د زيات مقدار واکسينونو د انتقال لپاره د واکسين مرکز ته .
- c : د څو ورځو (يوه هفتي) لپاره د واکسين د ساتلو په منظور استعمال يږي .

TYPICAL VACCINE COLD BOX



(دریم شکل ،
رکولڈ بکس ،

COLD BOX

په Cold Box ګڼی د واکسینونو ځای په ځای کول :

د بکس خوا ګانو لاندې او پاس برخه ګڼی منجمد شوی Ice Pack ایښودل کیږي (د شکل په مطابق) او په منځ ګڼی B.C.G او Measles, Polio واکسینونه او محملات ایښودل کیږي اما د D.T. D, P. T. واکسینونو او Ice Pack په منځ - ګڼی باید پلاستیک فوم او کاغذی ګټه کېږي ترڅو دغه واکسینونه د منجمد کیدو څخه وساتي (یعنی دغه درې واکسینونه باید منجمد نشي) بیا دغه بکس بند کړي، نو وړلونه به اماده شي.

کله چنه استعمال یږي نو بیا :

- a: د بکس منځ خلاص پریږدي چه وچ شي.
- b: د هر استعمال نه پس داخلي برخه او خارجي برخه یی چک کړي چه لیک نوی که لیک شوی وی فوراً یی یا تر میم کړي او یا هغه بیا مه استعمالوی او تبدیل یی کړي.
- c: همدا راز دهغی د قید سره رابری واخل چک کړي چه سالم وی.
- d: قلف ګونه او قید ونه یی چک کړي چه درست قید کېږي او که نه؟ او د قید پ صورت ګڼی بکس درست تاییت کیږي او که نه؟ قلف او بند ونه یی وخت په وخت غور کړي.

د حرارت درجه یی :

دادیوی هفتی لپاره واکسین ساتی اما پدی شرط چه وخت په وخت دهغه Ice pack بدل کړای شي او په منځ ګڼی باید یو تر ما میت ایښودل شوی وی کله چه Ice pack ویلی شي نو بیا ده د حرارت درجه په هر یو ساعت ګڼی ۱- ۵ درجه د ساتی ګریت سورپړی نو په دی صورت ګڼی ایښودل شوی Ice Pack صرف ده ساعتو لپاره کار کړي (دغه وخت نظر آب و هوا ته فرق کوی) نو باید هر ۵ ساعت بعد دهغه Ice Pack

تبدیل شی. مگر سبب خبره داده چه Cold Box یوازی په عاجل حالاتو کښی د Polio واکسین د مسائلو په خاطر استعمال شی او په نورو وختونو کښی یوازی د واکسین د انتقال په منظور استعمال شی.




VACCINE CARRIER & FLASK

استعمال ئی :-

- ۱- د کم مقدار واکسینونو دا خستلو او انتقال په منظور د ستور څخه.
- ۲- د کم مقدار واکسینونو د انتقال په منظور د صی مرکز څخه ساحی ته.
- ۳- واکسین صرف دیوی ورځی لپاره ساتی .

داستعمال طریقه ئی :


په منځ کښی ئی منبج شوی Ice Pack کښی دی او بیا پکښی Measles, Polio او B.C.G واکسینونه ان محلات کښی دی او بیا پر Ice Pack کیږدی او لپاسه پری کاغذی چته کښی دی او بیا د هغه لپاسه D.P.T. , D.T. او T.T واکسینونه کښی دی او بیا د هغه سر سبه کلک بند کړی او انتقال ورکړی.



(څلورمه شکل)
(واکسین کیریر)

VACCINE CARRIER

(د خلوړم شکل پاتی برخه)



د استعمال نه وروسته دهغه ځای په ځای کول: د هر استعمال نه وروسته ۱۷.۰

Flask باید لوڅ کینډول شي چه وچ شي او منځ ی باید پاک پریمنځل شي او ښه چک شي چه د رزوماتوالی ونلری او که کوم عارضه ولری باید فوراً ترمیم شي یا ئی باید نور استعمال نکړی. قلفونه ئی وگړي چه درست کار کوی یا نه؟ پلاستيکی فلاسک باید دمستقیم لمر څخه وساتل شي ترڅو چه لیک نشی.

د یخ بستې یا ICE PACK -


استعمال ئی: Cold Box او Vaccine Carrier د یخ سانلو لپاره استعمال ئی.

د استعمال طریقه ئی:

لمړی د یخ بستې په یخ چال کښی په منجمد کیدونکي برخه کښی ایښودل کښی ترڅو منجمد شي او بیا د یخ بستې په Cold Box او Vaccine Carrier کښی د هدایت سره سم ځای په ځای کیري دا بستې باید وخت په وخت چک شي چه لیک نشی.

منجمد شوی د یخ بستې د ۴ ساعتو لپاره کار وړکوی او باید هر ۴ ساعته وروسته هغه تبدیل کړای شي او زری بستې په یخچال کې کینول شي چه بیا منجمد شي او نور منجمد بستې د هغه په ځای استعمال شي .

دغه د یخ بستې هم یو علامه لری چه کله چه منجمد وی نو دغه علامه آبی رنگ لری اما کله چه د یخ بستې څومره شي نو هغه د علامې ځای هم په سپین رنگ بدل شي چه د دې معنی داده چه دا بسته څومره شوی او باید تبدیل کړای شي .



(پنجم شکل)
(د یخ بستې)

ICEPACK

د یخ بستې استعمال وړنده

د یخ بستې پوړ یخ بند ده .

د کولډ چین د وسایلو حرارت معلومو طریقې:

د Cold Chain د سیستم د حرارت د معلومولو لپاره درې نوعه ترمامیتر ونوځه کار اخستل کینی .

۱- ترمامیتر ساعتی څوړند یونکی نوعه

۲- فیت فی ترمامیتر


۳- VACCINE COLD CHAIN Monitor

۱- ساعتی ترمامیتر :

دا ترمامیتر د ساعت پښیرگرځی او څوړندیدو لپاره یو چنلگ هم

لری .


(شپږم شکل)
ساعتی ترمامیتر:



اود حرارت درجه‌ئی د عقرب پواسطه ښودل کېږي.

۲- فیتہ فی ترمامیتر:

دا ترمامیتر دیوی همواری فیتی په شان دی چه د حرارت درجې لپاسه فی یو مخصوص علامه ښکاره کېږي چه دا علامه د حرارت د درجې په زیاتوالی سره پورته ځي. چه د ۰ - ۲۰ درجه سانتی گریټ پورې خانه پورې شوی ده



۳- VACCINE COLD CHAIN MONITOR

دا یوه آله ده چه دهغی په ذریعه د Cold Chain د سامان آلاتو د نني حرارت معلومېږي. دا آله دیوی کاغذی پانی په خپړده چه په مخ اوشانی په مختلفو ژبو لیکل شوی دی چه د دی کاغذ د انگلیسی ژبی پانی فی ژبر رنگ اود عربی ژبی پانی فی شین رنگ لري. دغه آله خلور کړکی لري چه په نورمال حرارت کېږي یعنی کله

چه دهغه د حرارت درجه مثبت ۱۰ درجه سانتی گریټ څخه ښکته وی نو دغه کرکی سپین رنګ لری. چه دغه کرکی د A، B، C او D د کرکی په نومونو یادیري. اما کله چه د حرارت درجه د مناسبې درجې (مثبت ۱۰ درجه سانتی گریټ) څخه پورته لارښی نو په ترتیب سره اول د A کرکی بیا د B او بیا د C کرکی په ابی رنګ بدلیږي. او که زیات وخت دوام وکړي نو بیا د D کرکی هم ابی رنګ اخلي او یا هم که دلېر وخت لپاره د سامان دنده حرارت زیات اوچت شي (مثبت ۳۴ درجه د سانتی گریټ نه پورته) نو بیا هم کېدای شي چه د D کرکی ابی رنګ واخلي. (انم شکل)

Vaccine Cold Chain Monitor				
Date in	index	Location	Date out	index

 3M Monitor Mark U.S. Patent No. 3,364,141	INDEX/INDICE/ملا			
	A	B	C	

	If A all blue	If B all blue	If C all blue	If A, B, C & D all blue
--	---------------	---------------	---------------	-------------------------

Polio	Test vaccine before use Use within 3 months These vaccines may be used Use within 3 months
Measles	
DPT & BCG	
TT & DT	

SUPPLIER FOURNISSEUR	Name: _____ Nom: _____ Date of dispatch: _____ Date d'expédition: _____ Vaccine: _____ Vaccin: _____
---------------------------------------	---

Keep the Cold Chain Monitor with your vaccine.

When the monitor arrives....

complete the top part of the card

-fill in the date

-fill in the index (A,B,C,D)

-fill in the location

When the monitor leaves....

complete the top part of the card

fill in the date

fill in the index (A, B, C or D)

If windows A, B, C, & D are all white use vaccines normally.

If the windows A to C are completely blue but window D is still white it means that the vaccine has been exposed to a temperature above 10°C but below 34°C for the following number of days:

	INDEX		
	A	B	C
At a temperature of : 12°C	3 days	8 days	14 days
21°C	2 days	4 days	11 days

If only window D is blue it means that there has been a break in the cold chain of a temperature higher than 34°C for a period of at least two hours. Check the cold chain - Use vaccines normally

لومړۍ مخ

د کولډ چين مانيتور کارت

دوهم مخ «د کارت شا»

په تفصيل سره د دې آلي استعمال پدې ډول وړي.

۱- د کارت په پورته برخه کېنې څو ځانې دې چه لهر مرکز ته د رسيدو په وخت کېنې

او د لهر مرکز نه د وتلو په وخت کېنې بايد دهغه ځانې ټک کېدای شي پدې ځانو

کېنې دغه رنګ اجرات کېږي.

د Date in په ځانه کېنې به درارسيدو تاريخ وليکي.

Monitor له مخې د Cold Chain د حرارت

۲-د Index په ځانده کښې به د

درجه ویکي په دې ډول چه

VACCINE COLD CHAIN MONITOR				
Date in	Index	Location	Date out	Index
30.11.84	0	Central store		

monitor mark	Index	
	A	B
	C	

	If A all blue	If B all blue	If C all blue	If A, B, C & D all blue
polio				
measles		USE WITHIN 3 Mon.		USE WITHIN 3 Mon.
DPT & BCG				
TT & DT				

Supplier Name: Vaccine Supply Inc.

Fournisseur Date of dispatch: 1 November 1984

Vaccine: Polio (ORAL) and MEASLES

د نهم شکل

کولډ چین مانیتور د A ځانده

آبی شوه ده .»

که ټولې کڼې سپینې وي نو صفرو ویکي که هر کڼې آبی وي نو د هماغې کڼې نوم (D یا C, B, A) پکښې ویکي یعنې که د A ځانده آبی وه A که B ځانده آبی وه B که C ځانده آبی وه C یا ABC (که د D ځانده هم آبی وه ABCD) دیکه او که نوري ځانې سپینې وي او یوازې د D ځانده آبی وه نو یوازې D به پکښې ویکي

۳-د Location په ځانده کښې به د خپل مرکز نوم ویکي .

هر کله چه واکسین تاسې بل چیرته لږېږي نو بیا د Date out په ځانده کښې تاریخ ویکي او د Index ځانده کښې به هم د پورته پشان اجرات وکړي .

VACCINE COLD CHAIN MONITOR				
Date in	Index	Location	Date out	Index
16.4.84	D	Central	20.6.84	D
21.6.84	A	Region	21.8.84	AD
20.9.84	AD	District	24.8.84	BD
25.10.84	CD	Health Center		

Monitor mark	INDEX			
	A	B	C	D
	if A all blue	if B all blue	if C all blue	if A B C & D all blue
polio	Test vaccine field color use within 3 Mon. use within 3 Mon. these vaccines may be used			
measles				
DPT & BCG				
TT & DT				
Supplier	Name Vaccine Supply Inc.			
Fournisseur.	Date of dispatch 16.4.84			
	Vaccine D.P.T.			

کولم چین مانیتور د C, B, A و D کړکې آبی رنګ اغوستی دی.


۵- د کارت په شاتنی مخ کښی تاسی نه معلومات درکول شوی دی چېکه حرارت پورته ولاړ شئ نو په ژود د جو حرارت کښی کومه کړکې ژومره وخت بعد آبی رنګه شئ.

اما د کړکې په یوازی صورت هم آبی کیدای شئ پدې معنی چې که Cold Chain کښی کومه عارضه پیداشئ او حرارت یی د فکتاد ۸ ۳۴ نه پورته شئ نو په دوه ساعتو کښی د D کړکې هم آبی رنګ اخلی چې په دې صورت کښی د دې معنی دادچېه واکسین خراب ندی بلکه چې د C, B, A کړکې سپین رنګ لری او آبی شوی نه دی نو صرف عارضه دی اصلاح شئ او واکسینونه د استعمال وړ دی. اما مختلف واکسینونه علت خرابی یی چې د C, B, A او D کړکې یوه یوه یا ټولی آبی رنګ اخلی چې د دې تفصیل په دې ډول دی.

۱- کد A که کی نیمه‌ای آبی رنگ اخستی وی نوددی معنی داده چه واکسینونه د C + ۱۰ نه نه پورته حرارت نه معروف شوی دی. چه ممکن واکسین مناش شوی وی لکن اوس هم د استفاد وړدی.

۲- کد A که کی مکیده آبی شوه نوددی معنی داده چه ممکن د ډیر وخت راهیسی واکسین د مثبت لس دوجی سانی گویت نه پورته معروف شوی دی چه ممکن خنی واکسینونه خواب شوی وی نوپه لاندی ډول اجرات به وکړی.

 VACCINE COLD CHAIN MONITOR				
Date in	Index	Location	Date out	Index
19 July 1984	0	Central	19.10.84	0
19.10.84	0	Region	20.12.84	A
20.12.84	A	District	25.1.85	B
26.1.85	B	Health center		

Monitor Mark	Index			
	A	B	C	
	if A all blue	if B all blue	if C all blue	if A,B,C & D all blue
polio	These vaccines may be used			
measles				
DPT & BCG				
TT & DT				
Supplier	Name: Vaccine Supply Inc.			
Fournisseur.	Date of dispatch: 18 July 1984			
	Vaccine: MEASLES			

(یولسم شکل)

کولوچین مانیتور : کارت د مانیتور له مخی خانه پوری شوی اوشانی چه د A او B که کی پوره اود C که کی نیمه آبی شوی ده او هم په مختلفو وختونو کښی هغه چک شوی او په کارات کښی لیکل شوی دی.

- a- د Polio واکسين خراب شوی وی هغه مه استعمالوی .
 b- نور واکسينونه د استعمال وړ دي .
 ۳- که د A او B کړکي د واړه آبي شوی وی نو د دې معنی داده چه نسبتاً زیات وخت واکسين د مثبت ۱۰ درجې سانتی گریټ نه پورته حرارت ته معروض شوی وی نو:
 a- د پولیو Polio واکسين مه استعمالوی .
 b- د Measles واکسين په ۳ میاشتو کښی دښه استعمال کړی .
 c- نور واکسينونه په نورمال توگه استعمال کړی .
- ۴- که A ، B او C کړکي درې واړه آبي شوی وی نو د دې معنی داده چه د پوره ډیر وخت لپاره واکسينونه د مثبت ۱۰ درجې سانتی گریټ نه زیات حرارت پرمه وخت شوی گډو:
 a- د Polio واکسين مه استعمالوی .
 b- د B. C. G. / D. P. T., Measles واکسينونه په دې میاشتو کښی دښه دښه استعمال کړی .
 c- د T. T. / D. T. واکسينونه د استعمال وړ نه دي .
- ۵- که A ، B ، C او D کړکي ټولې آبي شوی وی نو دده معنی داده چه واکسينونه د خورا زیات وخت لپاره د مثبت ۱۰ درجې سانتی گریټ حرارت نه زیات حرارت ته معروض شوی او ټول واکسينونه خراب شوی او هغه بالکل مه استعمالوی .

د واکسينونو استعمال په محلي مرکز کښی :

ځنکو سره د خبری کولو نه وروسته ماشومان د عمر اود ضرورت وړ واکسينونو په لحاظ څر وپ بند ی کړی یعنی هغه ماشومان چه یو پوښان واکسينونه اخلي سره بیل بیل کړی ترڅو د واکسين د یو بوتل د خلا میدو په صورت کښی د هماغه څخه ټولو ماشومانو ته فوراً تطبیق شي . خپل د ضرورت وړ واکسين د ورځی د یخپال یا Cold Box څخه واخلی او هغه

دیخ دیار چو سرہ پہ V.C. یا Flask کبھی خای پہ خای کری Cold Box اوینچال
بیوتہ بند کری بیا V.C. یا Flask غنہم ہفہ وا کسین یو یورا وا خلی چہ کار پرے
کری مثلاً کمود B. C. G. وا کسین یو ویال را وا وا خست نو بیالومری تلو ہفہ
ماشومانوتہ دا وا کسین و کرے چہ ضرورت ورتہ لری اود دہ نہ پس بیا بل واکسین
شروع کری۔

د وا کسین د استعمال پہ وقت کبھی بد وا کسین ویال د پیل میز پر خد Ice Packs
پاسہ کین دی چہ یخ وے دھروا کسین د شروع کید و سرہ سم لومری بہ
پہ ہفہ واکسین د استعمال د ورخی نیتہ ویکلی او بیاد دھردوزا خستلو سرہ سم پری یو
خط کشوے تر خواستعمال شوے دوزونہ فی معلوم شی اودیواوبل دوز ترمخ
دا واکسین د Ice Pack پاسہ کین دی۔

پہ یاد ولرے چہ د Measles او B. C. G. وا کسین باید صرف د استعمال پہ
وقت کبھی د مربوطہ محلل سرہ یو خای شی او چہ کلہ موسرہ گد کرل نو بیال
دا واکسینونہ پہ آزادہ ہوا کبھی ۶ ساعت بعد خرابینے نو دی واکسینو
پہ تطبیق کبھی دیر احتیاط پہ کار دی یعنی کوشش و کرے چہ د دے
وا کسین تول ماشومان سرہ را تول کرے او بیاد غہ واکسینونہ سرہ گد
اوتولوتہ فی پہ یو خای استعمال کری خکہ دغہ واکسینونہ زیات د وام نشی کولا
او کہ د ماشومانوتہ د کم وہ نو پاتی مقدار فوراً V.C. یا Flask کبھی کین دی
اما پہ یاد ولری چہ د ورخی پہ ختم کبھی د V.C. یا Flask پہ منہم کبھی سائل شوی د
B.C.G. او Measles واکسینونہ ہم خرابینے او باید لہ منہم یورل شی۔ اما نور واکسینو
کہ درست وسائل شی ترد وہ ورخو پوری استعمال کیدای شی۔ لکن دھری ورخی پہ شروع
کبھی باید کوبنبن شی چہ کہ کوم استعمال شوی واکسین ویال موجود وی نو لومری باید ہفہ استعمال
او خلاص کرای شی او کہ چہ ہفہ خلاص شو نو بیال دی بل ویال شروع کرای شی۔

تعقیم کول یا STERILIZATION

خرنگہ چہ پہ واکسینیشن کبھی واکسین دانسان او ہفہ ہم د ماشوم بدن زرق کینے

نوفووری خبره داده چه باید د واکسین سامان آلات ټول باید په ښه توګه تعقیم شوی وی او هم د استعمال په وخت کېنې باید هغه د لاس او یا کوم منتن شی سره په تماس را نشي د استعمال په وخت کېنې باید هغه ستنې او سرخونه گرم نه وی او یخ شوی وی تاسی کولای شی چه د واکسینونو د تطبیق لپاره د تیار تعقیم شوی DISPOSABLE سرخونه و ستنې څخه هم کار واخلی لکن د هغه مصادرقات په ډیر زیات وی او هم به یی انتقال د واکسین د مرکز څخه جران وی نو بیا کولای شو چه د دی منظور لپاره په خپل مرکز کېنې تاسی ستنې او سرخونه تعقیم کړی چه تعقیم په درې طریقو سره کیدای شی .

۱- فزیکي طریقه :

د ډېول تعقیم د شعاع ، حرارت ، وچ حرارت ، بخار (او ټوکلاف) او یا هم د جوش وړ کولو پواسطه اجوا ، کپز ی چه د جوش وړ کولو په طریقه کېنې باید سامان افلا د جوش د وخت نه پس هم ۳۰ دقیقو لپاره و جوشول شی .

۲- په کیمیاوی طریقې سره تعقیم :

په دی طریقه کېنې د ضرورت وړ سامان آلات د ANTI SEPTIC او یا ANTI DISINFECTANT پواسطه منحل کپز ی چه د مواد عبارت دی له : سپریت (الکول) ، تینچر ، مارکی کروم ، دیتول ، هایدروجن پراکساید او نور څخه

۳- په مشترکه توګه تعقیم :

په دی طریقه کېنې لومړی سامان آلات د کیمیاوی موادو سره پال او بیا په یوه فزیکي طریقې سره هم تعقیم کپزی .

د تعقیم کولو طریقه :-

لومړی ستاسی د ورځی د ضرورت وړ سامان آلات (ستنې

سرخونہ پنس) جدا کری بیادغہ سامانونہ پہ او بو پریمچی چہ داغونہ اولکی لی لری شی
 (ہیٹھکھ صابون او بود استعمال نکری حکم مسکن دیو دریا صابون ذرات پہ سامان پوری
 پاتی شی چہ ہفہ بیا واکسین خرابوی) بیاد سرخونہ دوارہ برنی (سلند ساونوتہ)
 سرہیل کری او ہفہ پہ یو مالوچ یا گاز سو پاک کری بیاد ہر سرخونہ سلند ساونوتہ پہ یو
 گاز کینی داسی تاو کری چہ یو دبل سرہ پہ تماس رانشی او بیا پہ ہفہ کینی ورسوہ ستن ہم
 کین دی او داسرہ تاو کری پدی د ول چہ دستنی ٹوکہ بچہ نشی - بیادغہ سرخونہ او سامانونہ
 سرہ راٹول کری او پہ Tray کینی لی کین دی او بیادغہ تری پہ ستریلایز پرکینی دتنہ
 کین دی او بیا او پہ پہ ستریلایز پرکینی واچوی - او ستریلایز رکٹ وربند کری او برق
 لی چالان کری چہ کدہ پہ جوش راغلہ نو بیا ہم دقیقہ نور ہم جوش نہ ادا نہ ورکری - د ۳
 دقیقہ جوش خورہ لونہ پس ستریلایز مرکب ۷ (برق لی قطع کری) او ٹولہ حق پس
 پہ دیر احتیاط سامان تری بھر کری او پہ لی چہ کری او سامان بیرتہ پہ ستریلایز پرکینی
 کین دی - او پریردی چہ یخ شی کوشش وکری چہ دی شیانو سرہ ستاسی لاس او یا
 کورہ بل غیر معقم شی تماس و نکری ہر ہفہ سامان چہ دکوم شی سرہ ولگید د ہفہ تعقیم لہ منہ
 لی او ہفہ ماستمالوی - باید دومرہ سامان ستنی او پیچکاری تعقیم کری
 چہ ہرہ ورخ ستاسی د ہر ماشوم لپارہ او ہر واکسین لپارہ جدا جدا سرخونہ او ستن وی -
 اما د B C G واکسین لپارہ کیدی شی چہ یواری بو سرخونہ او بو ستنہ د خو خو کسانو
 لپارہ استعمال شی چہ پہ دی صورت کینی د ہر واکسین نہ وروستہ ستن د اور پواسطہ تعقیم کین
 یعنی دستنی ٹوکہ د الکل و د چراغ د لمبی لپاسہ نیول کیزی توخو د ستنی ٹوکہ سرہ شی
 (دوہ ثانیہ وخت پکاری) نو داستن تعقیم کینی لکن باید بیرتہ یو خہ وخت کینودل
 شی (دوہ ثانیہ) چہ ستن یخہ شی اما بیا لہ واکسین د ستنی دھوکی ٹخہ خارج کری ترخو
 ستن استعمال شی چہ بندہ نہ وی او کولای شی چہ د ورچی واکسینین پہ ختم کینی تولہ ستن
 پہ اور ونیشی چہ سرہ او تعقیم شی او بیا بیرتہ ستن یخہ کری او سرخونہ سرہ لی تاوہ کری
 د B. C. G. تطبیق دیو مخصوص سرخونہ پواسطہ کینی چہ ہفہ تہ B.C.G. Kit

والی دهری ودی پر شروع کینی دغه کیت تعقیم کیری او یوه ستنه په پورته طریق سره زیاتو ماشومانو ته استعمالین لکن که چه پخه شی، بنده او با کزه شی نو بیا دغه ستن د استعمال وړنده او باید تبدیل کرای شی .

همداراز د B. C. G سرخ په سلندر کینی یو Ring یا واشل دی چه ممکن هغه خړا او سرخ لبک شی چه په صورت کینی باید دغه واشل تبدیل شی او سرخ د سینه او ذیم کار کولو لپاره کیدای شی چه سلندر د کریس Grease سره غوړشی لکن هغه کله پترول یا Mineraloil ددی مقصد لپاره استعمالوی . او دهری ورخی په ختم کینی ټول سرخو اوستنی پاکي پریمنخی .

مختلف واکسینونه :

واکسینونه زیات دی خو په وقایوی توگه ۳ واکسینونه استعمال پیری چه ددی جملی څخه واکسینونه اوس د E.P.I په پروگرام کینی شامل دی چه عبارت دی د B. C. G , Measles , Polio , D. T. , D. P. T. او T.T. څخه چه دغه واکسینونه دلاندینی ناروغیو په مقابل کینی معایت تولید وی .

Tetanus , Pertussis , Diphtheria , Polio , Measles او Tetanus څخه .

چه ددی جملی واکسینونو څخه B. C. G او Measles واکسین بیل بیل اما پاتی دری واکسینونه په مشترک توگه پیدا کیری یعنی D. P. T. واکسین کینی د Pertussis, Diphtheria او Tetanus واکسینونه او په D. T. کینی بیا Tetanus toxoid او د Diphtheria واکسینونه او په T.T. کینی بیا یواری د تیتانوس توکساید موجود وی .

د عمله مخی د واکسینیشن د تطبیق جدول :

ټول تره کلوکم ماشومانو ته باید دغه د واکسینونو تطبیق شي لکن د دغه شپږ واکسینونو څخه هم د عمر په مختلف وختونو کېني مختلف واکسینونو تطبیق کېږي . باید چه ورسره تولد څخه څومره ژر چه کیدای شي واکسین شروع شي چه د عمر په تناسب ددی واکسینونو د تطبیق جدول په لاندی ډول دی .

د واکسینونو عمر	د تولد وخت	۱/۲ میاشتې کېني	۲/۳ میاشتې کېني	۳/۴ میاشتې کېني	۹ میاشتې کېني	۱۲ میاشتې کېني
B. C. G.	یو دوز	.	.	.	.	.
Polio	پیدایښي دوز	اول دوز	دویم دوز	درېم دوز	.	بوستر دوز
D. P. T.	.	اول دوز	دویم دوز	درېم دوز	.	بوستر دوز
Measles	.	.	.	.	یو دوز	.
D. T.	د واکسین د پکښي څخه وروسته شروع او په دری دوزونو ورکول کېږي .					
T. T.	ټولی ۱۵-۴۵ کلنې ښځي اول ځل دوه دوزونه په دوه میاشتو کېني سر په سر او بیا بوستر دوز د ځل په آخری میاشت کېني او بیا یو بل دوز د بل ځل ځل په وخت کېني ورکول کېږي په دی توگه دغه څلور دوزونه د ټول عمر لپاره معافیت ورکوي .					

البته دغه پورتنی پروگرام د ایمونایزیشن د منظم پروگرام په صورت کېني عملی کېږي خو که تاسی په یو O.P.D. کېني واکسینیشن پروگرام په غاړه لرئ نو ممکن چه ځینی ماشومان تر پنځه کلنۍ - پوری تاسی ته راشي چه دی ماشومانو ته د واکسینونو تطبیق کول په منظم پروگرام کېني نه راځي نو دی ماشومانو ته د دوی عمر د تناسب په نظر کېني نیولوسره واکسینونو تطبیق کېږي لکن د دوی د واکسین کولو څخه دغه باید د دوی څخه د پنځو واکسین کید و پوښتنه وشي چه کوم واکسین ځی کړی دی او که نه که کارت ځی په کور کېني وی هغه دی توی وغوښتل شي او د هغه په ملاحظه سره دی باقی پاتی نور دوزونه ورکړل شي . او که د اشیان روښانه نه وه نو د دوی په بدن دی واکسین ځایونه ولټول شي . که ځینی واکسینونو ځی کړی وی او د هغه څخه دیو حال نه زیات وخت نه وی تیر شوی نو هغه واکسینونه دی بیا تڅوار نشي او تعقیبي دوز دی ورکړل شي اما ځینی واکسینونه

لکه B. C. G. او یا Measles که یوخل شوی وی کفایت کوی. او باید تکرار نشی د غیر منظم واکسینونو د تطبیق لپاره د لاندی جدول څخه استفاده کیری.

د اول ویزیت پخت کښی د ماشوم عمر د تولد نه تر ۱ ۱/۲ یا شتی پوري	اول ویزیت کښی B. C. G. Polio Birth	دوهم ویزیت کښی (د اول ویزیت نه یو میاشت) وروسته د نورو واکسینونو لپاره د یو نیم میاشتې عمر کښی	درېم ویزیت کښی (د دوهم ویزیت نه د وروسته یو میاشت)	وروسته
۹م - ۱۲ میاشتې	DPT 1 Polio 1 B. C. G.*	DPT 2 Polio 2	DPT 3 Polio 3	په ۹ میاشتو کې Measles ته راوغواړی
۹-۲۳ میاشتې پورې	DPT 1 Polio 1 Measles* B. C. G.*	DPT 2 Polio 2	DPT 3 Polio 3	DPT Booster Polio Booster ته د وروسته (د ۱ کال بعد راوغواړی)
۵-۲ کلن	DT 1 Polio 1 Measles + B. C. G. +	DT 2 Polio 2		DT بوستر Polio بوستر ته (۱ کال بعد راوغواړی)
۴۵-۱۵ کلن	TT 1	TT 2	T.T. Booster میاشتو کښی راوغواړی. T.T. Booster ته د بیا د بل ځل عمل په وخت کښی راوغواړی.	

(+) لکه نه وی شوی

:- مختلف واکسینونه - دوزونه د یوځل مقده اړتۍ - اود تطبیق ځای تۍ :

واکسینونه	په کوم عمر کېنې تطبیق کېږي	خود دوزونه وړکول کېږي	د یوځلې دوز انداز	د تطبیق ځای تۍ
B. C. G.	دتولد څخه تره اکلن پورې	یو دوز	۱/۲ سی سی	د ښې مټ په پوستکي کېنې
POLIO	دتولد څخه تره اکلن پورې	(۵ دوزونه) Birth - اول، دوم، درېم، بوستر	یوځل ۲-۳ څانګې	د شری لپاسه اچول کېږي
D. P. T.	د ۱ میاشتې څخه تر ۱۲ کلنۍ پورې	(۴ دوزونه) اول، دوم، درېم بوستر	۱/۲ سی سی	د ورانه په عضله کېنې
MEASLES.	د ۹ میاشتې نه بعد تره اکلن	(یو دوز)	۱/۲ سی سی	په چپ مټ کېنې پوستکي لاندې
D. T.	د ۲ کلنۍ څخه تره کلنۍ پورې	(درې دوزونه) اول، دوم، بوستر	۱/۲ سی سی	د ورانه په عضله کېنې
T. T.	۱۵-۲۵ کلن ښځونه او ۵-۱۵ کلن ماشومانو ته	(خلو دوزونه) اول، دوم، او بوستر (درې دوزونه) او ۴ دوز د بل حل په دور کېنې	۱/۲ سی سی	د مټ په عضله کېنې

د مختلفو واکسینونو او د دغې د استعمال په برخه کېنې تفصیلات :

۱- B. C. G. واکسین :

دا واکسین ماشومانو ته د یو خطرناکه ناروغۍ څخه چه د سل یا توبرکلوز ناروغۍ ده نجات ورکوي توبرکلوز یا سل یو ساری ناروغۍ ده چه د دغې او سا کېنلو له لارې د یو څخه بل ته انتقال کوي او د ناروغۍ د ماشومانو د ضعیفوالی اوعنی د مرګ سبب هم کېږي نو د B. C. G. واکسین په ذریعه ستاسې ماشوم د دې ناروغۍ څخه پخپل کیدای شي دا واکسین صرف یوځل ورکول کېږي چه د تولد

د وخت څخه تر ه اکلنې پورې ورکول کېدای شي او همدا راز دغه واکسين هغه ځلې پرېسونل
نه چې د سل د ناروغانو سره ئې سرکار وې هم ورکول کېږي (پدې شرط چې د دې
کسانو توبرکولين تست منفي وي)

دغه واکسين Intradermal يا په پوستکي کېښي ورکول کېږي چې عموماً د ټټي لاس
په مټه کېښي تطبيق کېږي د تطبيق مقدار ئې د يو سي سي لسمه برخه (۱/۵ سي سي) ده چې هر وياړ
ئې لاس د وزن نه کېږي د دې دوا د تطبيق لپاره مخصوص سرخښونه دي چې د هغې پدريعه تطبيق کېږي.
د تطبيق څخه وروسته اول هغه ځای پرېښي او بالاخره دا ځای په زړه کونکې دانه بدلېږي چې دوه هفتي
وخت نيسي او دغه دانه تر دوه مياشتو پورې موجود اوزوې کوي لکن دوه مياشتي وروسته
پوستکي اچوې اوښه کېږي چې کله کله پدې موده کېږي ورسره د تخړگ عفونات هم پرېښي
او درد کوي البته دغه زخم د بدن طبيعي عکس العمل دي نور هيڅ شې نه ضرورت نشته صرف
هغه پاک وساتي اما پټي پري مه لگوي . B.C.G داغ عموماً په ټټي مټه وي د يو صدف په
اندازه وي او منع ئې شفاف وي پداسې حال کېښي چې د Small Pox داغ په چپ مټه
وي او منع ئې خالدار وي او په دې ډول دا دوه داغونه يو د بل څخه پېژندل کېږي .
د بي سي جي د دانې په صورت کېښي انټي بيوتيک او انټي پارټيک ورکول ضرور نه دي دا -
واکسين ټولو هغه کسانو ته ورکول منع دي چې واکسين توبرکولوز ولسي دي ، بي سي جي
واکسين په توبرکولين اثر کوي او ممکن هغه په غلظه مثبت کړي نو ځکه د توبرکولين د
تست د اجرا کولو په وخت کېښي بايد پوښتنه وشي چې په يوه مياشت کېښي د ننه د ننه ورته
بي سي جي نه وي شوي . دا واکسين مه منجهد کوي او د محلول کولو لپاره ئې د سيروم
څخه کار اخستل کېږي او هم دا واکسين د رنځ څخه بايد وساتل شي .

۲- د شري (سرخان) يا MEASLES واکسين :

شري يا Measles يوه ويريوسي ناروغي ده او ماشومان پري اغه کېږي چې د زياتو -
ناروغانو د ضعيف والي او د ډيرود مړيني سبب کېږي دا ناروغي د يو ماشوم څخه بل ته
دهوا او د خولې د قطراتو له لارې انتقال کوي . د دې ناروغي دواي هم دومره

موثره نه ده نوځکه فی واکسین ضروری Measles واکسین هم نیم سې سی او پیچپ مټ کښی دپوستگی لاندی تطبیق کښی دا واکسین د ۹ میاشتی څخه وروسته ورکول کښی ددی واکسین یوځل تطبیق کفایت کوی. دا واکسین په اختلاجاتو او فعال توپر کلوز کښی نه ورکول کښی.

ددی واکسین د دوام موده په آزاده هوا کښی ۶ ساعته ده. ددی واکسین پاتی - مقدار باید دهری ورځی په آخر کښی ضایع کړل شي. دحل کولو لپاره فی خپل مخصوص مایع استعمالیږی چه دگډولو په وخت کښی باید هم یخ وی دا واکسین باید یخ اود رڼا څخه محفوظ وساتل شي اود گډولو څخه وروسته باید په ۶ ساعتو کښی دمنه دمنه استعمال شي ددی ویال لس دوزه کښی.

۳- د فلجیا POLIO واکسین Vaccine Oral Polio (OPV) :-

پولیو یوه ناروغی ده چه اکثراً ماشومان پری اخته کښی. اود هغه دپښود شل والی او دلاسو نو دضعیف والی سبب کښی اوځی ځینی ماشومان وژنی د ناروغی دیو ویروس څخه پیدا کښی چه په سترگو نه لیدل کښی اود ناپاکه لاسونو او اوبو له لارې دیو شخص څخه بل ته سرایت کوی.

ددی ناروغی علاج خورا مشکل اونا ممکن دی نوځکه فی واکسین باید حتماً تطبیق شي.

دپولیو واکسین د قطری شکل کښی وی اود خولی له لارې ورکول کښی چه د ۲-۳ قطری پډبه اچول کښی لکن متوجه اوسی چه قطره چکان په خوله اوژبی پوری تماس ونکړی دا واکسین په پنځو دوزو ورکول کښی او هر ځل ۲-۳ څاڅکی وی دا واکسین هم د تولد څخه شروع کښی یعنی بودوز د ولادت نه پس ورکول کښی چه هغه ته (Birth Dose) وائی او بیا اول دوز په یوه نیمه میاشتی کښی او دویم دوز اول دوز نه یوه میاشت وروسته او دریم دوز د دوهم دوز نه یو میاشت وروسته او بوستر دوز بیا دریم دوز نه یو کال وروسته ورکول کښی.

دا واکسین هم باید در ناخن و سائل شنی دا واکسین هغه ماشومانو ته چه دستونی د
(Tonsillitis) عملیات کی وی تر ۳ هفتومه ورکوی. د دی واکسین هر بوتل
۲ دوزه کینی.

۴- DIPHTHERIA - PERTUSSIS - TETANUS TOXOID (DPT) واکسین:

دا واکسین یو مختلف واکسین دی چه د دفتري، شنه توخلي، او د تیتانوس د ناروغیو د
مخنیوی لپاره ورکول کینی چه لږ لږ دغه ناروغي ذکر کوو.

دیفتری DIPHTHERIA

دا یوه ناروغي ده چه په هغه کینی د غاړی د عضلاتو
د پړسوب له کبله تنفس بندیدي ناروغ نه خه خورلی شي او نه هوا تنفس کولای شي
نو د زیاتو ماشومانو د آبی مرگ سبب کینی. دا ناروغي هم د خولی د قطراتو او هواله لاسه
انتقال کوی.

شنه یا توره توخلي PERTUSSIS

دا هم یوه ناروغي ده چه ماشومان
پری اخته کینی ماشوم د پړسخت اود وامدار توخلي کوی ممکن خوراک او تنفس ی بند
شي او اکثره کانی کوی اوزیات د مرگ سبب کینی او د هوائی قطراتو له لاری انتقال
کوی.

تیتانوس (تشنج) TETANUS

دا یو ناروغي ده چه د ټول بدن
د عضلاتو د تشنج او شخوالي سبب کینی او د عضلاتو دغه شخوالي حتی د تنفس
د بند والی او مرگ سبب گرخی.

سری یو تختہ شخ شی غارہ اوپسبی ئی نہ قات کینی اود خولی نخئی زبونه جاری وی دغه مرض د خارو اود ورو د تماس نخه دیدن دیوی زخمی برخی سره پیدا کیری. مثلاً که د ماشوم نوم په ناپاکه چاره سره غوغ شی نو د تیتانوس امکان ئی شته D.P.T. واکسین ماشوم ته ددی دری وارو ناروغیو نخه نجات ورکوی دغه واکسین په ۴ دوزونو تطبیق کیری چه یو دوز په ۱/۲ میاشتني کینی دوم دوز یو میاشت بعد او دریم دوز د دوهم دوز نه یو میاشت وروسته او غلرم یا بوستر دوز ئی بیاد دریم دوز نه یو کال وروسته ورکول کیری.

دا واکسین لمرخل نیم شئی دورانه په عضله کینی ورکول کیری دا واکسین د حساسیت په صورت کینی نه ورکول کیری. ددی واکسین یو ویال ۲ دوزه کیری. دا واکسین مه منجمد کوی یعنی په (Freezer) کینی نه ساتل کیری. د دوام موده ئی په آزاده هوا کینی دوه ورځی ده. دا واکسین باید یخ او د لمر د رڼا نخه وساتل شی.

که ماشوم د اول دوز سره حساسیت وښائی نو پاتی نورد وزونه مه ورکوی. او د ماشوم په واکسنیشن کار او دایي راجستر او فیملی کارت کینی په سور خط و لیکي چه ماشوم د د واکسین سره حساسیته ښی. **۵- DIPHTHERIA TETANUS TOXOID (D.T.) واکسین:**

دا واکسین د دفترے

او تیتانوس د ناروغی د مخنیوی لپاره ورکول کیری. دا واکسین هم په دری دوزونو ورکول کیری چه لومړی دوز ئی د ۲ کلنۍ نخه بعد ورکول کیری. دوهم دوز ئی د اول دوز نخه یو میاشت وروسته او دریم دوز یا بوستر دوز ئی د دوهم دوز نخه یو کال وروسته ورکول کیری. دا واکسین هم نیم شئی دورانه په عضله کینی ورکول کیری.

۶- T.T. یا TETANUS TOXOID واکسین:

دا واکسین د تیتانوس د

مرض د مخنیوی په غرض ماشومانو او حامله ښځو ته ورکول کیری. ټول هغه ماشومان چه د پنځه کلو په عمر وی ورته دا واکسین ورکول کیری. او همدا راز ښځو ته د ۱۵-۴۵

کلو عمر ولری ورکول کیری دغه واکسین هم ماشومانو ته دری دوزونو ورکول کیری
 چا اول دوز په پنځه کلنۍ کې د دوم دوز یو میاشت وروسته او دریم دوز یو کال وروسته
 ورکول کیری. او په ښځو کې په ۴ دوزونو ورکول کیری. چه اول دوز په اول
 وار مراجعې کې ورکول کیری دوهم دوز یو میاشت بعد ورکول کیری او دریم دوز
 بیا د حمل په آخر میاشت کې ورکول کیری او څلرم دوز بیا په بله حمل کې ورکول کیری.
 چه دغه څلور دوزونه بیا د ټول عمر لپاره مورت معافیت ورکوی.
 دا واکسین هم نیم مې اؤمټ په عضله کې ورکول کیری ځنی نور واکسینونه چه د (EPI)
 په پروگرام کې شامل نه دی اما کله کله استعمالیږي عبارت دی له:

SMALL POX VACCINE یاد کوی یاغتی دانی واکسین:

دا واکسین د درې میاشتی

عمر څخه وروسته ورکول کیری لکن اوس د چیچک ناروغی له منځه تللی ده.

ANTI TETANUS SERUM :- دا واکسین د بوسټر دوز په توگه د سرک د سر په

ترافیکي حادثاتو کې ورکول کیری. 1 u. ۱۵۰۰ - ۳ یونټو پوری ورکول کیری.

T.A.B. VACCINE :- دا واکسین د محرقی (Thyphoid) او شبه محرقی

(Para Thyphoid) لپاره ورکول کیری.

CHOLERA VACCINE :- د اکولوا د مخنیوی لپاره استعمالیږي لکن موثریت یی کم دی.

RABIES VACCINE :- دا واکسین د لیونی سپي د خوړلو په وخت کې ورکول

کیری او په عصب باندې د توکسین د نصب څخه مخنیوی کوی. چه د ۱۰ - ۱۴ دوزه د
 بدن په عضله کې ورکول کیری.

YELLOW FEVER VACCINE :- دا واکسین د (Yellow Fever) د مخنیوی لپاره ور

کول کیری.

د واکسینونو مضاد استطبایات :

په لاندې حالاتو کېنې واکسینونه مه ورکوی.

۱- په عمومي توګه :

- (a) په ټولو وځیمو او شدید ناروغیو کېنې چه ناروغ انتې بیوټیک اخلي .
- (b) کله چه د وجود مدافعو سیستم خراب وی او بدن انتې بادی نشي جوړولای .
- (c) که ماشوم کلوکو کورټیکوسټروئید دواګانې لکه پریډنیزولون او کورټیکوسټروئید دواوی خوري ځکه دغه دواګانې د واکسین انتیجینک خواص او د انتې بادی د تحریک کولو توان ضعیف کوی .

۲- خو واکسینونه په یو ځای ډول په لاندې حالاتو کېنې مه ورکوی:

- (a) د حمل په دوران کېنې خو واکسینونه مه ورکوی ځکه ماشوم ته خطر رسوی .
- (b) که ماشوم انتې متابولیک دواګانې (لکه 6-MP, Actinomycin, Azathiopyrin) او Nitrogen Mustard خوري ځکه دغه دواګانې د بدن — (Primary Response) ضعیفوی .
- (c) که ماشوم اختلاج او یا کالګی ولری .

۳- د خاصو واکسینونو مضاد استطبایات :-

مختلف واکسینونه په مختلفو

حالاتو کېنې نه ورکول کېږي چه په لاندې ډول فی داسې ذکر کوو .

۱- B.C.G. واکسین :-

په فعال ټوبرکلوز او د DERMATOSIS کېنې او هم

که د ټوبرکلوسین تست فی کړی وی نو نړیوی میاشتي د واکسین ورته مه ورکوی .

- ۲- OPV. POLIO: دا واکسين د تانسېل په عمليات کېنې تر ۳ هفتو مه ورکوي .
 ۳- D.P.T. Vaccine: دا واکسين د حساسيت په صورت کېنې مه ورکوي .
 ۴- Measles Vaccine: دا واکسين په اختلاجاتو او فعال تو برکلوز کېنې مه ورکوي .

د مختلفو واکسينونو جانبي عوارض Side Effects او اختلاطات

- ۱- بي سي جي په نورمال ډول يو عکس العمل ښايي او د واکسين په ځای کېنې لومړي دوه دي ورځي سور والي او درد وي بيا په دوه هفتو کېنې په دانه بدلېنې چې تر دوه مياشتو دوام کوي او زوی ورکوي او ورسره ممکن په تخړگ کېنې لېغاوی عقدات هم وپرسېږي . مگر ممکن کله کله د غه دانه زیاته غټه او زیاتې زوی پکوي .
 ممکن دا واکسين د زوی لرونکي ځيلى ډاني Suppurative Adenitis سبب شي . ممکن د واکسين له کبله هډوکي هم منتن شي (Osteitis) او يا د پوستکي د تو برکلوزيک (انتان د Lupus) سبب شي او يا ممکن په ټول بدن کېنې د انتان سبب شي .

۲- D.P.T. واکسين په صورت کېنې :-

- د دې واکسين څخه وروسته تر ۱۲ ساعته تېه منع تر رځي چه ممکن يوشپه او ورځ دوام وکړي آسپرېن ي علاج دی مگر ځنې نور اختلاطات ي عبارت دي له :
 (a) عصبي اختلاطات لکه اختلاج او (ENCEPHALITIS)
 (b) د پېچکاری د ځای دانه کيدل .
 (c) موضعي او عمومي عکس العمل چه لوړه تېه ورسره وي .

۳- D.T. واکسين ممکن د الرژي " حساسيت " سبب شي .

۴- Measles واکسين :- دا واکسين ممکن د بوی لوړې تې ۱.۲-۱.۵ درجو

(د فارن هاید) سبب شی او هم یو جلدی سوروالی اور Rash) ممکن پیداکړی چه ۱۲-۱۶
ساعتو وروسته پیداکړی . او په درې ورځو کښی کښی .

هغه خطرات چه ممکن د واکسین کولو مخه پیداشی :

څرنګه چه واکسینونه هم ژوندی آرګنیزمونه دی نو د هغه د تطبیق په صورت کښی
هم د ځینی خطراتو احتمال شته چه د هغی واقعات د یو کم دی چه ممکن په یو میلیون
کسانو کښی یو واقع وکتل شی او عبارت دی له :

۱- ممکن ده چه (Toxoid) اوس هم (Toxogenic) اثر ولری ، مړه شوی
آرګنیزمونه (Killed Organism) شاید پوره مړه شوی نه وی او یا هم ضعیفه شوی
آرګنیزمونه پوره ضعیفه شوی نه وی او په دی توګه بدن ته د هغو تطبیق ممکن د
مرض د تولید او وخامت سبب شی .

۲- انتان او منتن کیدل : - دا هم ممکن ده چه یا واکسین د جوړیدو په وخت

کښی منتن شوی وی او یا هم د تطبیق په وخت

کښی منتن شی او په دی ترتیب د واکسین سره یو بل میکروب بدن ته داخل شی .
خصوصاً دا موضوع په عاجل کتلوی واکسینیشن کښی چه د تعقیم شرایط نه مراعات
کښی زیات پېښیدای شی .

۳- ممکن ځنی خلک د واکسین سره حساسیت ولری او په دی توګه د واکسین

تطبیق په هغوی کښی د یو شدید او خطرناک عکس العمل او الرژی سبب شی
او یا هم ممکن ENCEPHALITIS منع ته راوړی .

۴- ممکن واکسین د مربوط مرض د شدت سبب شی مثلاً که یو شخص توبرکلوز وګر

او هغه ته پی سی جی واکسین شی نو د هغه د مرض د شدت سبب کښی .

۵- ممکن واکسین په یوه شخص کېنې مرض ایجاد کړې لکن دغه شخص د-
مرض اعراض او علایم ونه ښائی او په دې توگه د یو مخنی سرایت ورکوونکې (Carrier)
په حیث د ناروغی د سرایت سبب شي .

د واکسینیشن ریکارډ- راجستر کول او دکارت ورکول:

دایمونایزیشن لپاره دکارت ورکول او راجستر کول پوره اهمیت لري لکه
چې د راتلونکې مراجعت په وخت کېنې د ریکارډ له مخې پخوانی معلومات حاصل کولای
شو او پوهیدای شو چې مراجع کونکې ته پخوا کوم واکسین ، خوځله او څه وخت -
تطبیق شوی دی د واکسینیشن راجستر درې برخې لري .

۱- د واکسینیشن عمومي یا دایمي راجستر

۲- د واکسینیشن ورځنۍ راجستر

۳- د واکسینیشن کارډ

د راجستر کولو طریقه:

پخوانی تردی چې یو ماشوم راجستر کېږي لومړی باید
دهغې د مشرانو څخه د پخوا واکسین کیدو په برخه کېنې پوښتنه وکړي که ئې پخوا
واکسین کړی وه نو بیا نړی د واکسین کارت وغواړي که د واکسین کارت ئې -
راوړ نو دهغې په ملاحظه به تعقیبي اجزات وکړي او که د واکسین کارت ورسره
نه وه نو بیا ئې د ماشوم په مټ داغونه ولټوي چې د بنې مټ لپاسه داغ د امعنی وړ-
کوي چې ماشوم ته (B. C. G.) شوی او د چېپ مټ لپاسه داغ د (Small Pox)
د واکسین او یا د T.T. په واکسین دلالت کوي.

۵، عمومي یا دایمي راجستر Permanent Register :-

د یو ماشوم د راجستر کولو لپاره لومړی د هغه نوم په عمومي راجستر کېنې

- (۱) دسل، تورې ټوڅلې، خواشنگ ټينانوس، د ماشومانو فلج «پلېو»، غږ د خلاصون لپاره خپل ماشومان د زيربڼه وڼه پس فوراً د واکسين مرکز ته بولي او واکسين کړي.
- (۲) د ماشوم د واکسين کيدو لپاره يو مياشت بعد خپل ماشوم دوباره نوموړي مرکز ته ورځي د بيا ورتلو تاريخ د همدې مه آخر کڼې ليکل شوی دی. بيا د لږې چټکۍ واکسين پيلز تکليف نېرولو سره به ستاسې ماشومان د دې خطر ناک ناروغيو څخه بچ کړای شي.
- (۳) د بي سي جي د واکسين مخ پر پيدا شوې دانه ب پخو وړو کوکښي چنډه مېنه شي د هغه مه ورپسې کاپري او پټې او ملهم مه ورپورې کوږه.
- (۴) که د واکسينشن نه پس ټبه پيدا شوه اسپرين يا پاراستامول ورکړي او که ټبه رياته شوه د واکسين تر مجموعه وکړي لکين د واکسين کال هم له ځان سره وروړي.
- (۵) د بيا راتلونکې ټبه

۴

۳

۳

PCPPI 1604 83 C.C.A.R. — 26.1.83 — 300,000 FORM AR 7

د کارت نمبر — د احوال کيدو نېټه

Expanded Program on Immunization
د پاکستان د صحت حکومه
د واکسينشن کارت

د کورني د مشورتي ټولنې

آدرس —

د کارت د احوال د مرکز نوم

FORM AR 7

300,000

FORM AR 7

پدې راجسټر کښې لومړۍ -
 نيټه دهرې ورځې په شروع کښې درج کيږي او بيا د ورځې مسلسل لېر ليکل کيږي
 او د هغه وروسته د ماشوم د کار د نمبر يا د عمومي راجسټر لېر د ماشوم نوم، د
 پلا، نوم او عمر ليکل کيږي او بيا په مربوطه خانو هغه واکسين په نښه -
 کيږي چه په دې ورځ ورته تطبيق کيږي پدې ډول په عمومي راجسټر
 او کارت کښې د ماشوم نوم يوځل د اول وار مراجعې په وخت کښې ليکل کيږي
 او هم د دوهم دريم او څلورم ځل د مراجعې په صورت کښې د هغه د نمبر له مخې
 سابقه پيداکيږي او هلته صرف مربوطه واکسينو نوځانې کښې تاريخ رسول -
 کيږي او هم په کارت کښې د اشان تاريخ نيټه، رسول کيږي پدې اسي حال -
 کښې چه د هر ځل مراجعې په صورت کښې په ورځنۍ راجسټر کښې د ماشوم ټول
 شهرت او نمبر د سره رسول کيږي او په دې توگه راجسټريشن مکمل کيږي،
 د واره راجسټري په خپل دفتر کښې ساتل کيږي، او کارت د ماشومانو مشر
 ته ورکول کيږي. د هر ورځې د کار په ختم کښې په ورځنۍ راجسټر کښې د کار
 خلص راپور د ~~خلاص~~ مخ د نمونې سره شتم جوړيږي چه دا کار بيا د مياشتې
 په آخر کښې ستاسي کارزيات آسانوي او مياشتنۍ راپور بيا په آسانه جوړيږي.
 کله چه د راجسټر ټول کار مکمل شي نو بيا د کارت په ملا خطه هر ماشوم ته مربوط
 په نښه شوي واکسينونه تطبيق کيږي همدا رنگه بايد د واکسين اجزات
 په کورني طبي کارډ، Family Card، کښې په پوره تفصيل او وضاحت وليکل شي.

د ورځنۍ او مياشتنۍ راپورونو ته يه کول

۱، ورځنۍ راپور :

د خپل هري ورځې د کار په ختم کښې د ورځنۍ راجسټر په
 آخر کښې د ورځنۍ کار او تطبيق شوي واکسينونو تعداد او د واکسين شوو ماشومانو تعداد

او د عمر په لحاظ د مختلفو عمر لرونکو ماشومانو تعداد چه ورته واکسين شوی دی
د غني مخ فورمه له مخي جوړ کړي (د کتاب آخر ضميمه وگوري).

b- میاشتنی راپور:

د دی میاشتنی په اوږد وکښي ستاسي د کار او فعالیت اندازه، د ټولو هغو ماشومانو تعداد چه واکسين مو ورته کړي او د هغه ښځو شمیر چه واکسين مو ورته کړي، او د مختلف واکسينونو د تطبیق اندازه، او د عمر په لحاظ د مختلف عمر لرونکو ماشومانو تعداد چه واکسين ورته شوی په دی کښي - ښودل کېږي. چه د میاشتنی په اوږد وکښي د ټولو ورځني راپورونو د مجموعي څخه جوړېږي. او بیا د راجسترد شماری سره سر وړ کول کېږي او د کتاب د ضميمي د میاشتنی راپور سره سم باید ترتیب کړای شي. د راپور باید دوه کاپي کړي یوه مرکز ته ولیږي او بله په خپله ریکارډ کښي په دغه د وسیه کښي وساتي چه د میاشتنی راپورونو لپاره مو انتخاب کړی ده. او همدارنگه به د میاشتنی راپور ترخواد واکسينونو د مصرف راپور هم جوړ کړي.

c- د واکسينونو د مصرف او بیا غوښتنی راپور (VACCINE Demand)

د هري میاشتنی په آخر کښي به د کتاب د آخر ضميمي مخ ۷۱ فورمي سره سم ټول واکسينونو د هغوی د تیر کړ میاشتنی نه پاتې تعداد دی میاشت کښي راوړل شوی تعداد، او همدارنگه په دی میاشت کښي مصرف شوی تعداد، او اوسني موجود تعداد اوضایح شوی تعداد د نوی میاشتنی لپاره ستاسي غوښتونکي مقدار، یکښي روښانه شوی وی ترتیب کړي البته د راپور هم باید دوه کاپي وی یوه کاپي له ځان سره وساتي او بله مرکزی د فتره یو متي، او خپله کاپي به په مربوطه د وسیه کښي (vaccine demand) کېږي. همداراز په دی راپور کښي د واکسينونو برسيره د الکولو، مالوچو، خاور تیل او نور د ضرورت وړ شيانو مصرف او نوی ضرورت هم باید ولیکل شي او راوغوښتل شي.

د، دگودام یا یخچال په منځ کښی د واکسینونو شمیرلو راپور:

ددی لپاره چمتاسی د خپل واکسینونو د شمیر او د هغه د (Expiry Date) نڅه ښه باخبره پاتی شی نو هره ورځ به دگودام یا یخچال واکسینونه (Inventory sheet) د پانې له مخی موجودی کوی. (ددی پانې نمونه د کتاب په آخر ضمیمه ۷ مخ وگوری). یعنی د هر واکسین تعداد اود (expiry date) اود یخچال د حرارت درجه د کار په شروع او ختم کښی باید و لیکل شی او سبا بیا مصرف شوی مقدار تر ی کم کړای شی او موجود واکسین باید بیا درج شی پدی توگه د میاشتی په آخر کښی چه ستاسی دا فورمه دکنه شی هغه په یو تاملی دوسیه کښی چه ددی فارمونو لپاره مو اختصاص کړی او ور باندی مو (Inventory Sheets) لیکلی دی خوندي کړی.

ع- د ستریلایزیشن راپور:

هره ورځ چه تاسی ستریلایزیشن کوی نو د ستریلایزیشن د مخصوصی فورمی له مخی (د کتاب په آخر ضمیمه کښی ددی فورمی نمونه وگوری) باید تاسی هره ورځ د ستریلایزیشن د شروع وخت د جوش وخت او د ستریلایزیشن د ختم وخت په فورمه کښی د هغه ورځی تاریخ په مقابل کښی درج کړی او د ورځی په ختم کښی د مصرف شوے مواد و اندازه هم په هغه کښی درج کړی او د میاشتی په آخر دغه پاڼه هم په خپل یو مخصوصه دوسیه کښی چه (Sterilization Forms) پری لیکل شوی وی کیر دی.

خپل ټول اسناد ښه خوندي وساتی او د ضرورت په وخت کښی هغه خپل مرکزی دفتر ته وسپاری او هم د کال په ختم کښی د خپل کال ټول اسناد بغیر د دايمي راجسټر نڅه په یو درست پاکت کښی خوندي واچوی او پری د خپل مرکز نوم اود واکسین د اسناد و نوم اود هغه کال چه دا اسناد پکښی اجرا شوی په روښانه ټکو و لیکي او مرکزی دفتر ته یی د حفاظت اوسانتی په خاطر واستوی. مرکزی دفتر ونه هم باید دا اسناد په ښه توگه منظم او ساتی.

(۴) DEFAULTER LIST راپور:

(Defaulter) هغه چاته ويل

کينډۍ چه په تا کلي موده کينډۍ خپل واکسين نه رانښي چه البته دهرۍ مياشت په آخر کينډۍ به دهر واکسين د Defaulter کسانو لست د نموني سره (۷۳ مخ وگوري) ترتيب کړي او يو کاپي ئي مرکزي دفتر ته استوي او يو کاپي به ئي د — (DEFAULTERS) په دوسيه کينډۍ کيږي.

SURVEILLANCE يا د مرضي واقعاتولست:

واکسيناتور به دهرۍ مياشتي په آخر کينډۍ دخپل ساحي د طبي يونټ د داکتر په مرسته د غلست ترتيب کړي چه په دې لست کينډۍ به د دې شپږو ناروغيو د پېښو تعداد او تفصيلات د ۷۴ مخ د فوري سره سم توفېر کوي. البته د دې فوري يو کاپي به مرکزي دفتر ته ليږي او يو کاپي به په خپل ريكارډ کينډۍ د Surveillance list په دوسيه کينډۍ کيږي.

د کلني مفصلي احصائي تهيه کول:

د هر کال په ختم کينډۍ بايد واکسيناتور د ۷۷ مخ د فوري سره سم د سيمي په حقله ټول مربوطه معلومات يعني د سيمي د کورنيو شمير د سيمي د ټول نفوس شمير د سيمي د ۱۵-۰۰ کلن ماشومانو شمير د ۲-۵ کلن ماشومانو شمير د صفر-۲ کلن ماشومانو شمير د ۱۵-۴۵ کلنو ښځو شمير په روښانه توگه ليکي او همدا راز به د واکسين د تطبيق په برخه کينډۍ د ضرورت وړ معلوماتونه د فوري له مخي خصوصاً د ۱۵-۴۵ کلن ښځو او د صفر-۲ کلن ماشومانو په برخه کينډۍ به معلوماتونه په واضح توگه ليکي. او همدا راز به دخپل يو کلن کار په تجربه کينډۍ خپل مشکلات، پېښو، احوالات او نظريات په لنډه او واضح جملو کينډۍ ليکي او دوه نقله

به فی ترتیب کرے یونقل به مزکرے دفتر نه واستوی
 او یونقل به په خیل ریکارد کینی وساتی .

نمت بالخیر

DAILY REGISTER

[illegible]

[illegible]

MONTH _____ YEAR _____
 B.H.U. _____ DISTRICT _____

دواکشنیشن میاشتنی راپور

ضلع یاشهر

1- Immunization Performed during this Mon. of _____ Monthly Immunization Return
 ۱- هغه واکسینون چه صرف یک میاشت کنی تطبیق شودی:

AGE Groups	Total attend- dances	POLIO				D. P. T.			D. T.			T. T.			Med- sles	Remarks
		0	I	II	III	Br	I	II	III	Br	I	II	III	Br		
0-11 M.																
12-23 M.																
2-4 Y.																
5+ Y.																
Ladies between 15-45 Y.																
Total																

2- up to date does work since Jan. 19 _____ to date during the curent year
 هغه واکسین ددی حال د جنوری د اول نمبر تراوسه تطبیق شوی

0-11 M																
12-23 M																
2-4 Y																
5+ Y																
Ladies between 15-45 Y																
Total																

دواکسینا تو را امضاء
 دواکسینا تو را نوم
 دغه فورمه باید دهری میاشت پد آخر کنی ژر تر ژره خاند پوری کوی
 او بول F-51 مقرر تی وسپاری توخو هغدی P.D.M. د فتر ته ورواستوی.

VACCINE REQUEST FORM

دواکسينونود غو بنستلو فارم

Name of B.H.U. _____ Dist./Agency _____ Mon. _____ Year _____

S.No.	DETAILS	POLIO	B.C.G.	D.P.T.	D. T. T.	T. T. T.	Measles	Saline Water	Remarks
1	Balance from previous Month								
2	Vials/Amp. received this Month								
3	Total 3 = 1 + 2								
4	Vials/Amp. used in this month								
5	Vials/Amp. destroyed in this month								
6	Total 6 = 4 + 5								
7	Balance at the end of this month 7 = 3 - 6								
8	Vials/Amp. now Needed.								
9	Received from Store keeper.								

Name of Applicant _____ Designation _____ Address _____

Signature _____ Dated _____

Note: 1. Demand Vaccines for 5 weeks instead of 4 weeks

2. Given reasons in remarks column if more or less vaccine demanded.

VACCINES & SUPPLIES CONTROL CARD

[illegible]

۷۳

د واکسینیشن د غیر حاضرانولست

Disst/Agency _____

Note: Defaulters are those whose I or III dose was due but who did not come. Tick in remarks column those defaulters who responded as a result of follow-up list.

Monthly surveillance report

دماشتی معرفی پینبو راپور

BHU _____ Year _____ District _____ Mon. _____				
Diseases	Vaccinated	Unvaccinated	Vaccination Status unknown	Total
Measles				
Pertus sis				
Diphtheria				
Neonatal Tetanus				
Other Tetanus				
Poliomyelitis				
Tuberculosis				
Submitted by _____ Supervisor of Vaccination Activities				
Date: _____				
Received by: _____				
Date: _____				

A list of those Immunized who have become ill in spite of immunization will be prepared giving following information.

Disease.	Name of patient.	Age.	No. of vaccine dose given.	Date of Immunizations.	Place of Immunization.
----------	------------------	------	----------------------------	------------------------	------------------------

COLD CHAIN

PERFORMANCE REPORT

Mon.

District

[illegible]

د واکسینونو د ورغنی کنترول پايه

District _____

Mon. _____ Year: _____

[illegible]

ED = Expiry Date

کال:

ولایت:

اولسوالی:

د واکسینیشن د مرکز نوم:

A. د سیمې په برخه کې معلومات:

۱- د سیمې د نفوس ټول شمیر:	۴- د سیمې د ۰-۲ کلن ماشومانو شمیر:
۲- د سیمې د کورنیو شمیر:	۵- د سیمې د ۲-۵ کلن ماشومانو شمیر:
۳- د سیمې د ټول ماشومانو (۰-۱۵ کلن) شمیر:	۶- د سیمې د (۱۵-۲۵ کلن) نیمو شمیر:

B. د واکسین شویو کسانو په برخه کې معلومات:

۱- ټیټې:	واکسین او مختلف عمر لرونکي خلک	شمیر یې	د نفوس له مخې فیصد یې
هغه ټیټې چې د T.T. واکسین ورته شوی وي:			
هغه ټیټې چې د T.T. واکسین مکمل غلور دوزونه اخستی دي:			
هغه ټیټې چې د T.T. واکسین غیر مکمل دوز یې اخستی دي:			
هغه ټیټې چې د T.T. واکسین یې پیل نه دی اخستی:			
۲- د ۰-۲ کلن ماشومانو شمیر:	۳- د سیمې هغه ماشومان چې د ۰-۲ کلن په عمومي توګه واکسین شوي دي:		
۴- د سیمې هغه ماشومان چې د ۰-۲ کلن په بېل واکسین شوي نه دي:			
۵- د سیمې هغه ماشومان چې د ۰-۲ کلن ماشومان په مکمل واکسین شوي دي:			
۶- د سیمې هغه ماشومان چې د ۰-۲ کلن ماشومان په غیر مکمل واکسین شوي دي:			

C. شدید عکس العمل د واکسین په مقابل کې (او اختلالات) شمېره وه:

D. د واکسین په دوران کې د واکسینیشن د ټیم مشکلات څه و؟:

E. د واکسیناټور پېشنهادات د کار د پیل د نېټې په خاطر:

F. د واکسیناټور خلص نظریه:

د واکسیناټور امضاء:

د واکسیناټور نوم: